

Aide mémoire

AXITINIB
INLYTA®

Formes /Présentation / Prix

- Formes et prix : comprimés, rouge, gravés « Pfizer » sur une face :
 - 1 mg : ovale, gravé « 1 XNB » sur l'autre face, 8,6 x 4,3 mm **783,46 €**
 - 3 mg : rond, gravé « 3 XNB » sur l'autre face, 6,35 mm **2 239,68 €**
 - 5 mg : triangle, gravé « 5XNB » sur l'autre face, 7,7 x 7,7 mm **3 646,21 €**
 - 7 mg : losange, gravé « 7XNB » sur l'autre face, 10,35 x 7,5 mm **5 052,74 €**
- Présentation : plaquettes thermoformées de 56 comprimés.



Tampon de la pharmacie

Votre posologie est stricte et individuelle, pour l'établir votre médecin tient compte du type de votre maladie, de vos antécédents et de votre tolérance au traitement.

La thérapeutique ciblée orale est un traitement anticancéreux, ce traitement nécessite **un suivi rigoureux**.

Consignes générales



Respectez votre prescription médicale et **notez systématiquement chaque oubli sur un carnet.**



Vous ne devez jamais croquer, écraser, mâcher ni sucer les comprimés d'Axitinib (INLYTA®).

En cas d'oubli d'une prise de médicaments : prenez la prochaine dose normalement et **ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.**

En cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités.**



Si vous avez **pris accidentellement trop de comprimés, contactez immédiatement votre oncologue.**

N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre oncologue.



Lavez-vous soigneusement les mains **avant et après** chaque prise.



Conservez votre traitement hors de la portée des enfants.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés : ne les jetez pas dans la poubelle avec les ordures ménagères.

N'ayez jamais recours à **l'AUTOMEDICATION** (même certains médicaments ou tisanes à base de plantes comme le millepertuis) : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Certains aliments sont contre-indiqués (ex : pamplemousse, réglisse).

➔ **Parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin traitant.**

Donnez leur la liste complète de vos médicaments, même ceux vendus sans ordonnance.

Attention, ce médicament contient du lactose : Si vous avez été informé par votre médecin que vous ne pouvez pas tolérer ou digérer certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Quand devez-vous prendre Axitinib (INLYTA®) ?



Tous les jours, **deux fois par jour**, avec un grand verre d'eau. **Toujours à la même heure, à 12h d'intervalle environ pendant ou en dehors des repas, mais toujours de la même façon.**

Comment devez-vous conserver Axitinib (INLYTA®) ?



Dans sa boîte d'origine. Ne pas stocker dans un pilulier.
A l'abri de l'humidité.
A une température ne dépassant pas 25°C.

Exposition au soleil ?



L'exposition au soleil n'est pas recommandée : protégez-vous avec un écran haute protection d'indice 50 et +, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.

Chute des cheveux sous Axitinib (INLYTA®) ?



Cet effet indésirable est fréquent, mais réversible à l'arrêt du traitement. Vous avez la possibilité de porter une perruque (prise en charge partielle par l'assurance maladie).

Limitez les soins agressifs : teinture et permanente.



Votre vie en pratique ?



Utilisez une **contraception** efficace pendant le traitement et jusqu'à une semaine après l'arrêt du traitement.

L'allaitement est interdit pendant le traitement.

Pratiquez une **activité physique** : cela contribue à une meilleure qualité de vie corporelle et physiologique.

Si vous partez en **vacances**, **emportez** toujours **vos ordonnances** ainsi que **vos cartes vitales** et faites activer votre dossier pharmaceutique (DP).



Effets indésirables les plus fréquents **Prévention et conduite à tenir en cas de :**

Diarrhées

Buvez au moins 2 litres d'eau par jour.

Limitez votre consommation de lait, de café.

Évitez l'alcool, les boissons gazeuses, les matières grasses, les aliments riches en fibres (légumes verts, céréales, fruits, etc).

Privilégiez les viandes blanches, les poissons maigres, le riz, les féculents, les pommes de terre, les carottes, les bananes...

Si votre médecin vous a prescrit un traitement anti-diarrhéique, prenez-le dès la première selle liquide. **Si votre diarrhée persiste → contactez votre médecin traitant.**

Hypertension artérielle

Si vous ressentez des maux de tête, des palpitations, des sensations de vertiges ou des bourdonnements d'oreilles → contactez votre médecin traitant.

Prudence en cas de conduite de véhicule.

Fatigue

Respectez une bonne hygiène de vie (alimentation saine, repos, petite marche).

Nausées, vomissements, perte d'appétit

Prenez :

- les antivomitifs prescrits par votre médecin,
- des repas légers et fractionnés (5 à 6 repas par jour).

Buvez fréquemment de l'eau fraîche, du cola dégazéifié, par petites gorgées entre les repas.

Évitez les aliments frits, gras, épicés, trop sucrés.

Possible modification du goût et d'infections au niveau de la bouche (aphtes)

→ Demandez conseil à votre pharmacien.

Troubles cutanés

Sécheresse de la peau : utilisez un savon doux sans parfum et une crème hydratante.

Picotements, gonflement, rougeur de la paume des mains et de la plante des pieds (syndrome mains-pieds) → contactez votre médecin traitant et évitez, l'exposition au soleil, les vêtements et les chaussures trop serrés.

Utilisez un savon doux et une crème hydratante.

Trempez vos mains et vos pieds dans l'eau fraîche puis séchez sans frotter.

Modification de la voix

Voix rauque ou perte partielle de la voix nécessitant une mise au repos des cordes vocales.

Si cet effet est trop gênant → parlez-en à votre pharmacien.



Vous présentez des effets indésirables qui vous inquiètent : **contactez votre médecin traitant**, il décidera de la meilleure conduite à tenir.



Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la notice.