

# Aide mémoire

## CYPROTERONE ANDROCUR<sup>®</sup> et génériques

### Formes / Présentations / Prix ANDROCUR<sup>®</sup>

#### - Formes :

Comprimé sécable à **100 mg** : blanc à légèrement jaune, avec la marque « LA » de part et d'autre de la barre de cassure et avec un hexagone régulier sur l'autre face.

Comprimé sécable à 50 mg : blanc à légèrement jaune, avec une barre de cassure sur une face et la marque « BV » dans un hexagone régulier sur l'autre face.

#### - Présentations :

Boîte de **60 comprimés** sécables sous plaquettes thermoformées.

Boîte de **20 comprimés** sécables sous plaquettes thermoformées.

#### - Prix :

**11 €** la boîte de **20 comprimés à 50 mg**, soit **0,55 €** le comprimé

**80,87 €** la boîte de **60 comprimés à 100 mg**, soit **1,35 €** le comprimé.

**Tampon de la pharmacie**

**Votre posologie est stricte et individuelle**, pour l'établir votre médecin tient compte du type de votre maladie, de vos antécédents et de votre tolérance au traitement.

**L'hormonothérapie orale est un traitement anticancéreux, ce traitement nécessite un suivi rigoureux.**

## Consignes générales

### Consignes générales



Respectez votre prescription médicale et notez systématiquement chaque oubli sur un carnet.

Vous ne devez jamais couper, écraser, mâcher, ni sucer les comprimés de Cyprotérone.



Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.



Si vous avez pris accidentellement trop de comprimés, contactez immédiatement votre oncologue.

N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans l'avis du médecin qui vous l'a prescrit.



Lavez-vous soigneusement les mains **avant et après** chaque prise.



**Conservez votre traitement hors de la portée des enfants.**



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés : ne les jetez pas dans la poubelle avec les ordures ménagères.

N'ayez jamais recours à **l'AUTOMEDICATION** (même certains médicaments ou de tisanes à base de plantes comme le **millepertuis**) : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.

➔ **Parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin traitant. Donnez la liste complète de vos médicaments même ceux vendus sans ordonnance.**

**Attention, ce médicament contient du lactose** : Si vous avez été informé que vous ne tolérez ou ne digérez pas certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament

### Quand devez-vous prendre Cyprotérone?



Avec un grand verre d'eau, **tous les jours, à la même heure, en une prise.**

### Comment devez-vous conserver Cyprotérone ?



Dans sa boîte d'origine.  
A l'abri de l'humidité.  
A température ambiante.

### Exposition au soleil ?



Même si Cyprotérone n'est pas photosensibilisant, l'exposition au soleil n'est pas recommandée : protégez-vous avec une crème solaire très haute protection (indice 50+), un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.

### Chute des cheveux sous Cyprotérone?



Cet effet indésirable est rare.  
Limitez les soins agressifs type teinture ou permanente.



### Votre vie en pratique ?



Cyprotérone peut provoquer des vertiges, une fatigue ou une somnolence. Soyez prudent en cas de conduite de machines ou de véhicules.

Pratiquez une **activité physique** : cela contribue à une meilleure qualité de vie corporelle et physiologique.

Si vous partez en **vacances**, emportez toujours votre ordonnance et faites activer votre dossier pharmaceutique (DP).



## **Effets indésirables les plus fréquents** **Prévention et conduite à tenir en cas de :**

### **Troubles hépatiques**

**Evitez** les aliments frits, gras, trop sucrés, l'alcool.  
Prenez des repas légers.  
Faites régulièrement vos analyses sanguines pour le foie.

### **Insuffisance veineuse des membres inférieurs**

⇒ **Portez des bas de contention**, pratiquez une activité physique régulière, maintenez un poids normal, évitez les sources de chaleur.

### **Bouffées de chaleur, transpiration excessive**

⇒ **Evitez les facteurs déclenchants** comme l'alcool, la caféine, le tabac, les aliments chauds et épicés. Buvez beaucoup d'eau fraîche.  
Restez au frais. Portez des vêtements légers.  
Si ces symptômes vous incommodez, consultez votre médecin traitant.

### **Fatigue**

⇒ Respectez une bonne hygiène de vie.

### **Maux de tête**

⇒ Prenez du paracétamol si nécessaire.  
Si ces douleurs persistent, consultez votre médecin traitant.

### **Prise de poids**

Privilégiez une **alimentation équilibrée riche en fibres, fruits et légumes mais pauvre en sucres et en graisses d'origine animale**.  
Faites régulièrement de l'exercice. Contrôlez votre poids.



Vous présentez des effets indésirables qui vous inquiètent :  
**Contactez votre médecin traitant**, il décidera de la meilleure conduite à tenir.



Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la notice.