

Aide mémoire

ETOPOSIDE CELLTOP[®]

Formes / Présentations / Prix

- Formes et présentations :

Boîte de **40 capsules** de couleur beige dosées à **25 mg** sous plaquettes thermoformées de 10 capsules.

Boîte de **20 capsules** de couleur rose dosées à **50 mg** sous plaquettes thermoformées de 10 capsules.



Celltop[®] 25 mg



Celltop[®] 50 mg

- Prix : **234,27 €** la boîte de **40 capsules** à **25 mg**, soit **5,86 €** la capsule.
182,08 € la boîte de **20 capsules** à **50 mg**, soit **9,10 €** la capsule.

Tampon de la pharmacie

Votre posologie est stricte et individuelle, pour l'établir votre médecin tient compte du type de votre maladie, de vos antécédents et de votre tolérance au traitement.

La chimiothérapie orale est un traitement anticancéreux, ce traitement nécessite un suivi rigoureux.

Consignes générales



Respectez votre prescription médicale et **notez systématiquement chaque prise et oubli sur un carnet.**

Vous ne devez jamais écraser, mâcher ni sucer les capsules d'Etoposide (CELLTOP®).



En cas d'oubli d'une prise de médicaments : prenez la prochaine dose normalement et **ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.**

En cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités.**



Si vous avez **pris accidentellement trop de capsules, contactez immédiatement votre oncologue.**

N'arrêtez jamais votre traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans l'avis du médecin qui l'a prescrit.



Lavez-vous soigneusement les mains **avant et après** chaque prise.



Conservez votre traitement hors de la portée des enfants.



Rapportez à votre pharmacie toutes les capsules endommagées ou inutilisées : ne les jetez pas dans la poubelle avec les ordures ménagères.

N'ayez jamais recours à l'AUTOMEDICATION (même certains médicaments ou tisanes à base de plantes) : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.

→ Parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin traitant.

Donnez leur la liste complète de vos médicaments, même ceux vendus sans ordonnance.

Quand devez-vous prendre Etoposide (CELLTOP®)?



Avec un grand verre d'eau de préférence, à la **même heure avec ou sans aliment, mais toujours de la même façon**, en 2 ou 3 prises chaque jour de traitement.

Comment devez-vous conserver Etoposide (CELLTOP®)?



Dans sa boîte d'origine. Ne pas mettre dans un pilulier.
A température ambiante (entre 15°C et 25°C).
A l'abri de l'humidité et de la lumière.

Exposition au soleil ?



L'exposition au soleil n'est pas recommandée : protégez-vous avec un écran haute protection d'indice 50 et +, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.

Chute des cheveux sous Etoposide (CELLTOP®)?



Cet effet indésirable est peu fréquent mais réversible à l'arrêt du traitement. Vous avez la possibilité de porter une perruque (prise en charge partielle par l'assurance maladie).

Limitez les soins agressifs : teinture et permanente.



Votre vie en pratique ?



Utilisez une **contraception** efficace pendant le traitement.

L'allaitement est interdit pendant le traitement.

Pratiquez une **activité physique** : cela contribue à une meilleure qualité de vie corporelle et physiologique.

Si vous partez en **vacances**, **emportez** toujours **vos ordonnances** ainsi que **vos cartes vitales** et faites activer votre dossier pharmaceutique (DP).



Effets indésirables les plus fréquents **Prévention et conduite à tenir en cas de :**

Diminution du nombre de certaines cellules sanguines

En cas de fièvre (température supérieure ou égale à 38°C), frissons ou tout autre signe d'infection (toux, mal de gorge, sensation de brûlures urinaires) → consultez sans attendre votre médecin traitant.

Ne prenez pas de paracétamol sans avis médical.

Nausées, vomissements

Prenez :

- les antivomitifs prescrits par votre médecin,
- des repas légers et fractionnés (5 à 6 repas par jour).

Buvez fréquemment de l'eau fraîche, du cola dégazéifié, par petites gorgées entre les repas.

Évitez les aliments frits, gras, épicés, trop sucrés.

Plaies douloureuses dans la bouche (aphtes)

Faites des **bains de bouche** sans alcool.

Utilisez une brosse à dents souple et un dentifrice doux sans menthol après chaque repas.

Évitez les aliments épicés, trop chauds, acides et irritants.

Humidifiez votre bouche avec un brumisateur.

En cas de douleurs diffuses ou de brûlures → contactez votre oncologue.



Vous présentez des effets indésirables qui vous inquiètent : **contactez votre médecin traitant**, il décidera de la meilleure conduite à tenir.



Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la notice.