

# Fiche Information Patient

## Protocole AVASTIN

Ce protocole comprend l'administration d'un médicament:  
**AVASTIN® (bévacizumab)**

Cette cure sera répétée toutes les semaines, tous les 15 ou 21 jours, en perfusion intraveineuse.

Avec une durée moyenne d'administration de 2 heures.

| Quels sont les effets secondaires ?   |  |  |
|---|--|--|
| Fréquence   | Prévention   | Que Faire ?  |
| <b>FREQUENTS</b>  |  |  |
| <b>Hypertension artérielle</b>  | Votre tension artérielle sera surveillée par l'équipe soignante.                   | Au besoin votre médecin pourra vous prescrire un médicament.                                     |
| <b>Saignements de nez</b> (épistaxis) le plus souvent peu abondants mais fréquents            |  | Prévenez l'équipe soignante.   |
| <b>Manque d'appétit</b>   | Prenez plusieurs petites collations par jour.<br>Mangez lentement, buvez beaucoup. | Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique.<br>Demandez les conseils d'une diététicienne. |
| <b>MOINS FREQUENTS</b>  |  |  |
| <b>Retard à la cicatrisation des plaies</b>   | Surveillez la moindre blessure qui surviendrait en cours de traitement.            | En cas de mauvaise cicatrisation, signalez-le rapidement à votre médecin.                        |
| <b>Troubles rénaux</b> (protéines dans les urines)  |  | Votre médecin fera une analyse d'urine (bandelette urinaire) avant chaque injection d'AVASTIN®   |
| <b>Hémorragies</b> : présence de sang dans les vomissements, les expectorations ou les selles |  | Prévenez rapidement votre médecin.   |
| <b>Douleurs importantes à l'abdomen</b> avec nausées, constipation ou autres symptômes        |  | Prévenez rapidement votre médecin.   |
| <b>Troubles cutanés</b> : sécheresse, dépigmentation  |  | Parlez-en à votre médecin.   |

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun**

# Fiche Information Patient

## Protocole AVASTIN

### Recommandations générales

#### ◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

#### ◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

#### ◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol).

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.