

# Fiche Information Patient

## Protocole CARBO TAXOL AVASTIN

Ce protocole comprend l'administration de 3 médicaments :

**CARBOPLATINE<sup>®</sup> (Paraplatine)**

**TAXOL<sup>®</sup> (Paclitaxel)**

**AVASTIN<sup>®</sup> (bévacicumab)**

Ce protocole sera administré par perfusion intraveineuse des 3 médicaments à J1, puis TAXOL seul à J8 et J15 sur un cycle de 21 jours.

La durée moyenne d'administration sera d'une journée à J1, et de 2 heures à J8 et J15.

### Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
<b>FREQUENTS</b>		
<b>Nausées, vomissements</b>	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements. Mangez lentement et fractionnez les repas.	Si les vomissements ont lieu moins d'1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouvelez la prise. Si les vomissements persistent, prévenir votre médecin.
<b>Chute des cheveux</b>	Un casque réfrigérant pourra être proposé pour limiter cet effet, s'il n'y a pas de contre-indication. Pas de soin agressif type teinture ou permanente.	Une prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.
<b>Signes d'infection</b> : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang, moins fréquents grâce à l'administration hebdomadaire	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<b>Hypertension artérielle</b>	Votre tension artérielle sera surveillée par l'équipe soignante.	Au besoin votre médecin pourra vous prescrire un médicament.
<b>Saignements de nez</b> (épistaxis) le plus souvent peu abondants mais fréquents		Prévenez l'équipe soignante.
<b>Manque d'appétit</b>	Prenez plusieurs petites collations par jour, mangez lentement, et buvez beaucoup d'eau.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. Demandez les conseils d'une diététicienne.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun**



# Fiche Information Patient

## Protocole CARBO TAXOL AVASTIN

### Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
<b>MOINS FREQUENTS</b>		
<b>Hypotension</b> , ralentissement du rythme cardiaque		Votre médecin surveillera votre tension et votre cœur pendant le traitement.
<b>Diarrhées</b>	Evitez les aliments épicés et frits. Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine.	Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin.
<b>Saignements inhabituels, hématomes, pétéchiés (tâches rouges sur la peau), selles noires</b> , liés à la baisse du nombre de plaquettes dans le sang	Attention aux coupures et blessures. Utilisez une brosse à dents souple. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.	En cas de saignement, exercez une pression ferme pendant 10 à 15 minutes. A Avertir le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes.
<b>Réactions allergiques</b> : fièvre, frissons, démangeaisons, sensations de malaise, rougeurs	Des médicaments anti-allergiques seront administrés avant l'injection.	Prévenez rapidement le médecin ou l'infirmière.
<b>Engourdissements et fourmillements dans les doigts et les orteils</b>		Signalez cet effet au médecin ou à l'infirmière.
<b>Douleurs musculaires et articulaires</b>		En parler à votre médecin qui pourra vous prescrire des antalgiques.
<b>Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres</b>	Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Evitez les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Prévenir le médecin qui pourra vous prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale.
<b>Retard à la cicatrisation des plaies</b>	Surveillez la moindre blessure qui surviendrait en cours de traitement.	En cas de mauvaise cicatrisation, le signaler rapidement à votre médecin.
<b>Troubles rénaux (protéines dans les urines)</b>		Votre médecin fera une analyse d'urine (bandelette urinaire) avant chaque injection d'AVASTIN®
<b>Hémorragies</b> : présence de sang dans les vomissements, les expectorations ou les selles		Prévenir rapidement votre médecin.
<b>Douleurs importantes à l'abdomen avec nausées, constipation ou autres symptômes</b>		Prévenir rapidement votre médecin.
<b>Troubles cutanés</b> : sécheresse, dépigmentation		En parler à votre médecin.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun**

# Fiche Information Patient

## Protocole CARBO TAXOL

### AVASTIN

## Recommandations générales

### ◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

### ◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

### ◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol).

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.