

Fiche Information Patient PROTOCOLE FOLFIRI AVASTIN

Ce médicament comprend l'administration de 3 médicaments :

5-Fluoro-uracile associé à l'acide folique

CAMPTO[®] (Irinotecan)

AVASTIN[®] (Bevasuzumab)

AVASTIN[®] sera administré toutes les semaines ou tous les 15 jours avec une durée moyenne d'administration de 2 heures.

CAMPTO[®] sera administré tous les 15 jours après la perfusion d'AVASTIN et sera suivi d'une perfusion de 5FU à votre domicile pendant 48 heures, par l'intermédiaire d'un diffuseur portable.

La durée moyenne d'administration à l'hôpital sera d'environ 1 demi journée.

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Diarrhées (survenant en moyenne 4 à 8 jours après la cure)	Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine.	Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang,	Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
Hypersudation, crampes abdominales, larmoiements, conjonctivite, hypersalivation, troubles de l'accommodation visuelle, diarrhées immédiates et profuses, dit syndrome cholinergique	Ces effets peuvent survenir très rapidement après la perfusion mais sont habituellement prévenus par une injection d'un médicament adapté (atropine).	
Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres	Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Prévenir le médecin qui pourra vous prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale.
Hypertension artérielle	Votre tension artérielle sera surveillée par l'équipe soignante.	Au besoin votre médecin pourra vous prescrire un médicament.
Hémorragies : saignements de nez, présence de sang dans les selles, dans les vomissements et les expectorations		Prévenir rapidement votre médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

PROTOCOLE FOLFIRI AVASTIN

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
MOINS FREQUENTS		
Nausées, vomissements	Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas.	Si les vomissements ont lieu moins d'1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir votre médecin.
Retard à la cicatrisation des plaies	Surveiller la moindre blessure qui surviendrait en cours de traitement.	En cas de mauvaise cicatrisation, le signaler rapidement à votre médecin.
Manque d'appétit	Prendre plusieurs petites collations par jour, manger lentement, boire beaucoup	Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique. Demander les conseils d'une diététicienne.
Douleurs importantes à l'abdomen avec nausées, constipation ou autres symptômes		Prévenir rapidement votre médecin.
Pulsations cardiaques accélérées ou irrégulières, essoufflement, respiration difficile, gonflement des pieds		Prévenir le médecin, des examens cardiaques peuvent être nécessaires.
Troubles cutanés : sécheresse, dépigmentation		En parler à votre médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

PROTCOLE FOLFIRI AVASTIN

Recommandations générales

◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol) sans en parler à votre médecin.

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

◇ AUTRES REMARQUES

○ *Contactez votre médecin* en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.

○ Indiquez-lui si vous souffrez de zona, goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.