

Fiche Information Patient PROTOCOLE FOLFOX VECTIBIX

Ce protocole comprend l'administration de 3 médicaments :

5-Fluoro-uracile associé à l'acide folique

ELOXATINE[®] (Oxaliplatine)

VECTIBIX[®] (Panitumumab)

Ce protocole sera administré tous les 15 jours à l'hôpital par perfusion intraveineuse d'environ une demi journée, suivie d'une perfusion à votre domicile sur 48 heures, par l'intermédiaire d'un diffuseur portable.

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Réaction cutanée : acné, rash, érythème, prurit, sécheresse cutanée	Se protéger du soleil : ne pas s'exposer ou utiliser un écran total. Un traitement préventif associant soins locaux et antibiotiques est généralement prescrit.	En parler à votre médecin. L'acné est généralement réversible après le traitement.
Mucite, stomatite : Aptides, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres	Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Faire systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction d'autres produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenir le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie).
Troubles de la sensibilité des extrémités, de la bouche et de la gorge : crampes, sensations de décharges électriques	Eviter les expositions au froid, le contact avec des objets froids, porter des gants pour vous protéger. Boire des liquides à température ambiante.	Avertir le médecin qui pourra modifier les doses.
Sécheresse de la peau et rougeur des mains, des pieds. Douleurs dans les mains ou les pieds (syndrome main-pied)	Eviter de rester trop longtemps debout, de porter des chaussures serrées. Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.	En parler à votre médecin.
Signes d'infection : fièvre, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang	Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
Altération des ongles (infection du lit de l'ongle, décollement)	Se couper les ongles courts afin qu'ils ne se fissurent pas ou se soulèvent. Consulter un podologue pour des soins préventifs.	Prévenir le médecin en cas d'infection.
Douleurs abdominales, diarrhées	Limiter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boissons contenant de la caféine.	Boire beaucoup d'eau. Prévenir les médecin si les diarrhées persistent plus de 48 heures.
Nausées, vomissements	Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas.	Si les vomissements ont lieu moins d'1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir votre médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

PROTOCOLE FOLFOX VECTIBIX

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
MOINS FREQUENTS		
Manque d'appétit	Prendre plusieurs petites collations par jour, manger lentement, boire beaucoup.	Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique. Demander les conseils d'une diététicienne.
Chute des cheveux	Pas de soin agressif type teinture ou permanente.	Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.
Saignements inhabituels, hématomes, selles noires, liés à la baisse du nombre de plaquettes dans le sang	Attention aux coupures et blessures, utiliser une brosse à dents souple, ne pas utiliser de thermomètre rectal.	En cas de saignement, exercer une pression ferme pendant 10 à 15 minutes. Avertir le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes.
Tachycardie : Pulsations cardiaques accélérées, essoufflement		Prévenir rapidement le médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

PROTOCOLE FOLFOX VECTIBIX

Recommandations générales

◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol) sans en parler à votre médecin.

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

◇ AUTRES REMARQUES

○ *Contactez votre médecin* en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.

○ Indiquez-lui si vous souffrez de zona, goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.