

Fiche information patient

JEVTANA

JEVTANA® (CABAZITAXEL) est administré en perfusion intraveineuse à l'hôpital tous les 15 ou tous les 21 jours.

La durée moyenne d'administration est de 2 heures environ.

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
TRES FREQUENTS A FREQUENTS		
Signes de fatigue ou d'essoufflement liés à la diminution de globules rouges dans le sang	Votre médecin contrôlera régulièrement votre taux de globules rouges dans le sang.	Prévenez votre médecin en cas d'apparition de ces signes.
Signes d'infection : fièvre, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
Saignements inhabituels, hématomes, pétéchies (tâches rouges sur la peau), selles noires , liés à la baisse du nombre de plaquettes dans le sang	Attention aux coupures et blessures. Utilisez une brosse à dents souple. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.	En cas de saignement, exercez une pression ferme pendant 10 à 15 minutes. Avertir le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes.
Diarrhées	Evitez les aliments épicés et frits. Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine.	Prenez les médicaments prescrits (Imodium - Smecta). Buvez beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenez le médecin.
Nausées, vomissements	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements; Mangez lentement et fractionnez les repas.	Si les vomissements ont lieu moins d'1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouvelez la prise. Si les vomissements persistent, prévenez votre médecin.
Constipation	Privilégiez une alimentation riche en fibres. Buvez beaucoup d'eau. Pratiquez quelques exercices légers.	En parler au médecin ou à l'infirmière.
Perte d'appétit, altération du goût	Prenez plusieurs petites collations par jour. Mangez lentement et buvez beaucoup d'eau.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. Demandez les conseils d'une diététicienne.
Chute des cheveux 10% des cas	Pas de soin agressif type teinture ou permanente	Une prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.
Douleurs articulaires 10% des cas		En parler à votre médecin qui pourra vous prescrire des antalgiques.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Fiche information patient

JEVTANA

Recommandations générales

◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

○ *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.

○ *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.

○ *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.

○ *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.

○ *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol).

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.