

# Fiche Information Patient

## Protocole NAVELBINE IV

Ce protocole comprend l'administration d'un médicament :

**NAVELBINE® (Vinorelbine)**

Par voie intraveineuse une fois par semaine à l'hôpital.

La durée moyenne d'administration sera de 2 heures.

### Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
<b>FREQUENTS</b>		
<b>SIGNES D'INFECTION :</b> fièvre, toux, maux de gorge <b>liés à la baisse de globules blancs</b> dans le sang	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	<b>Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C.</b> Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<b>SAIGNEMENTS DE NEZ ET SAIGNEMENTS DE GEN-CIVE</b> <b>liés à la diminution du nombre de plaquettes</b> dans le sang	Utilisez une brosse à dents souple.	<b>Si vous constatez l'apparition de bleus ou de petits points rouges</b> essentiellement au niveau des jambes, appelez sans délai votre médecin traitant. <b>Si vous devez bénéficier de soins dentaires,</b> informez votre médecin. <b>Ne prenez ni Aspirine ni anti-inflammatoire</b> sans avis médical. <b>Les injections intra-musculaires</b> sont fortement <b>déconseillées.</b>
<b>SIGNES D'ANEMIE</b> pouvant se manifester par un <b>essoufflement à l'effort</b> et/ou au repos, <b>une majoration de la fatigue et des bourdonnements d'oreille.</b>		Si ces symptômes apparaissent, appelez votre médecin traitant.
<b>Constipation</b>	Adoptez une alimentation riche en fibres (privilégiez fruits et légumes). Buvez 1,5 l de liquide par jour particulièrement les eaux minérales (riches en magnésium) qui ont des propriétés laxatives. Préservez une activité physique (comme la marche par exemple).	Si ce trouble persiste, appelez votre médecin traitant.
<b>Atteinte de la sensibilité des extrémités au niveau des mains et/ou des pieds</b>		Pensez à le signaler à votre oncologue lors de votre prochain rendez-vous.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun**

# Fiche Information Patient

## Protocole NAVELBINE IV

### Recommandations générales

#### ◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

#### ◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

#### ◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol).

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.