

## Fiche Information Patient PROTOCOLE TORISEL

Le **TORISEL** est administré par perfusion intraveineuse toutes les semaines à l'hôpital.

La durée d'administration est de 2 heures.

### Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
<b>FREQUENTS</b>		
<b>Diminution de l'appétit et fatigue</b>	Prenez plusieurs petites collations par jour Mangez lentement et buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. Demandez les conseils d'une diététicienne.
<b>Augmentation du taux de glucose</b>	Une glycémie sera effectuée avant et pendant le traitement. <b>Si vous êtes diabétique :</b> ce médicament peut entraîner un déséquilibre de votre diabète nécessitant une adaptation de votre traitement. !! Pendant le 1er mois du traitement, la <b>surveillance habituelle journalière</b> de votre diabète doit être <b>renforcée</b> pour éviter toute complication.	Une soif excessive et/ou une envie fréquente d'uriner doivent être signalées au médecin. Des médicaments hypoglycémians peuvent être prescrits.
<b>Augmentation du taux de cholestérol et triglycérides</b>	Un bilan sanguin cholestérol et triglycérides sera effectué avant et pendant le traitement.	Des médicaments hypolipémiants si besoin peuvent être prescrits par votre médecin
<b>Infections pulmonaires (essoufflement, toux, fièvre)</b>		Prévenez rapidement le médecin.
<b>Réactions allergiques</b>	Des médicaments anti-allergiques seront administrés avant l'injection.	Prévenez rapidement le médecin ou l'infirmière.
<b>MOINS FREQUENTS</b>		
<b>Signes d'infection : fièvre, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang</b>	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Lavez-vous souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<b>Troubles de la fonction rénale</b>	Bien boire après la séance.	Votre médecin surveillera votre fonction rénale et pourra adapter les doses.
<b>Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres</b>	Brossez-vous régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et évitez les dentifrices mentholés. Évitez les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Prévenez le médecin qui pourra vous prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale.
<b>Réactions cutanées, type acné sur le visage, les épaules ou le tronc ; sécheresse cutanée</b>	Protégez-vous contre le soleil (écran total).	Réaction réversible à l'arrêt du traitement. Consultez l'équipe médicale.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun**

# Fiche Information Patient PROTOCOLE TORISEL

## Recommandations générales

### ◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

### ◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

○ *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.

○ *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.

### ◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol)

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie. **Ne pas boire de jus de pamplemousse, qui peut interagir avec le TORISEL.**