

Fiche Information Patient Protocole BLINCYTO® (blinatumomab)

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hématologue ou oncologue

BLINCYTO® est administré
en perfusion intraveineuse continue de 28 jours suivie de 15 jours de repos.
La poche de perfusion est changée tous les 3-4 jours.

Quels sont les effets secondaires ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
TRES FREQUENTS		
Signes d'infection	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
Fièvre, frisson	Prenez la prémédication avec Paracétamol prescrit par votre médecin	Si persistance, prévenez votre médecin traitant afin d'éliminer une infection
Affections hématologiques : baisse des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes	Une prise de sang sera réalisée régulièrement pendant toute la durée du traitement	En cas d'apparition de signes d'infection (fièvre, toux, maux de gorges), de saignements inhabituels, d'un essoufflement à l'effort et/ou au repos avec une majoration de la fatigue , contactez votre médecin. Une adaptation de votre traitement pourra être nécessaire.
Affections du système nerveux : céphalées, tremblements, vertiges		Informez-en votre médecin.
Troubles du métabolisme de la nutrition : baisse du potassium dans le sang, augmentation du taux de sucre dans le sang. Diminution de l'appétit	Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. Mangez ce que vous aimez en plusieurs petites collations par jour. Buvez beaucoup.	En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Toux	Limitez si possible les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse.	Contactez le médecin si ces signes surviennent.

Fiche Information Patient

Protocole BLINCYTO®

(blinatumomab)

Quels sont les effets secondaires ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
TRES FREQUENTS		
Nausées, Vomissements, Diarrhées, Constipation, Douleurs abdominales	<u>Vomissements</u> : Buvez plutôt entre les repas. Evitez les aliments frits, gras et épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers. <u>Diarrhées</u> : Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Parlez-en à votre médecin, des médicaments symptomatiques peuvent vous être prescrits.
Douleurs dorsales, extrémités douloureuses, arthralgies, douleurs osseuses		En cas d'apparition, prévenez votre médecin
Insomnie	Essayez de maintenir des habitudes régulières de sommeil.	Prudence en cas de conduite de véhicule ou d'utilisation de machines.
Fatigue	Respectez des temps de repos dans la journée et soyez à l'écoute de votre corps.	Pratiquez une activité physique adaptée et régulière Si la fatigue persiste, parlez en à votre médecin. Prudence en cas de conduite de véhicule.
Œdèmes des membres	Elevez vos pieds lorsque vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Evitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids : s'il augmente de façon rapide et inattendue, contactez votre médecin.

Malgré le soin apporté à la rédaction des fiches, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra être imputée aux auteurs.
Merci de nous en informer en nous contactant par mail : 3C@ch-saintonge.fr

Fiche Information Patient

Protocole BLINCYTO®

(blinatumomab)

Recommandations générales

◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

○ *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.

○ *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.

○ *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.

○ *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol).

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.