

Fiche Information Patient

Protocole TAXOL AVASTIN

Ce protocole comprend l'administration de 2 médicaments :

TAXOL[®] (Paclitaxel)

AVASTIN[®] (Bevasuzumab)

Le TAXOL[®] sera administré de manière hebdomadaire et l'AVASTIN[®] tous les 15 jours.

La durée moyenne de la perfusion des deux médicaments est d'une demi journée

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang, moins fréquents grâce à l'administration hebdomadaire	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Lavez-vous souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
Hypertension artérielle	Votre tension artérielle sera surveillée par l'équipe soignante.	Si besoin, votre médecin pourra prescrire un médicament antihypertenseur.
Picotements et sensation de fourmillements ou d'insensibilité dans les mains et les pieds (neuropathie périphérique) Douleurs dans les articulations et les muscles		En parler à votre médecin qui pourra adapter votre traitement. Ces phénomènes disparaissent souvent à l'arrêt du traitement mais peuvent également persister en s'atténuant dans le temps.
Saignements de nez (épistaxis)		En parler à votre médecin
Manque d'appétit	Prenez plusieurs petites collations par jour. Mangez lentement et buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. Demandez les conseils d'une diététicienne.
Chute des cheveux	Un casque réfrigérant pourra être proposé pour limiter cet effet, s'il n'y a pas de contre-indication. Pas de soin agressif type teinture ou permanente	Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Fiche Information Patient Protocole TAXOL AVASTIN

Quels sont les effets secondaires ?

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
MOINS FREQUENTS		
Hémorragies : présence de sang dans les selles, dans les vomissements et les expectorations	Surveillez la moindre blessure qui surviendrait en cours de traitement.	Prévenez rapidement votre médecin
Troubles rénaux avec apparition de protéines dans les urines		Votre médecin fera une analyse d'urine (bandelette urinaire) avant chaque injection d'AVASTIN
Retard à la cicatrisation des plaies		En cas de mauvaise cicatrisation, le signaler à votre médecin.
Mucite, stomatite : Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres	Brossez-vous régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et évitez les dentifrices mentholés. Évitez les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Faites systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction d'autres produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenez le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie).

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Fiche Information Patient

Protocole TAXOL AVASTIN

Recommandations générales

◇ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

◇ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- *Si vous fumez*, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- *Eviter de boire de l'alcool*, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- *Protégez-vous des rayons du soleil* : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- *Les médicaments sont éliminés* pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine.
- *Surveillez régulièrement la zone cutanée* autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale.

◇ MEDICAMENTS ASSOCIES

○ *Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin*, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol).

○ *Pendant votre traitement*, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

○ *Informez votre oncologue référent* des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.