

Fiche Information Patient **AFINITOR® (Évérolimus)**

Qui peut prescrire AFINITOR® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer AFINITOR® ? : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

• Comprimés de couleur blanche ovales dosés à 2,5 mg, 5 mg et 10 mg.

- Boîtes de 30 comprimés à 2,5 mg (1480 € la boîte)
- Boîtes de 30 comprimés dosés à 5 mg (2716 € la boîte)
- Boîtes de 30 comprimés dosés à 10 mg (3500 € la boîte)



Comment prendre AFINITOR® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



La posologie habituelle de AFINITOR® est de 10 mg en une seule prise par jour.

Les comprimés doivent être pris avec un grand verre d'eau, **toujours à la même heure**, pendant ou en dehors des repas.

Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni écrasés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de AFINITOR®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements: attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver AFINITOR® ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **AFINITOR® (Évérolimus)**



Le pamplemousse (jus et pulpe) est à éviter pendant votre traitement par AFINITOR®.



Le millepertuis peut baisser l'efficacité de AFINITOR®. Il est fortement déconseillé d'en consommer.

Quels sont les effets secondaires du AFINITOR® (Évérolimus) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Mucite, stomatite : Aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres	Brossez-vous régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et évitez les dentifrices mentholés. Évitez les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Faites systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction d'autres produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenir le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie).
Sécheresse cutanée, éruption cutanée, prurit	Protégez-vous du soleil et utilisez un écran total. Appliquez une crème hydratante.	Parlez-en à votre médecin.
Nausées, vomissements, manque d'appétit	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements. Mangez lentement et fractionnez les repas. Prenez plusieurs petites collations par jour et buvez beaucoup.	Si les vomissements ont lieu moins d'1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyc), renouvelez la prise. Si les vomissements persistent, prévenez votre médecin. Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. Demandez les conseils d'une diététicienne.
Diarrhées	Évitez les aliments épicés et frits. Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine.	Buvez beaucoup d'eau (minimum 2 l/jr). Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenez le médecin.
Augmentation du taux de glucose	Une glycémie sera effectuée avant et pendant le traitement. Si vous êtes diabétique : ce médicament peut entraîner un déséquilibre de votre diabète nécessitant une adaptation de votre traitement. !! Pendant le 1er mois du traitement, la surveillance habituelle journalière de votre diabète doit être renforcée pour éviter toute complication.	Une soif excessive et/ou une envie fréquente d'uriner doivent être signalées au médecin. Des médicaments hypoglycémisants peuvent être prescrits.
Augmentation du taux de de cholestérol et triglycérides	Un bilan sanguin cholestérol et triglycérides sera effectué avant et pendant le traitement.	Des médicaments hypolipémiants si besoin peuvent être prescrits par votre médecin
Fatigue	Anticipez les moments de fatigue et prévoyez des moments de repos. Fixez-vous des priorités.	Signalez-le à votre médecin