

# Fiche Information Patient

## PROTOCOLE BRENTUXIMAB

### BRENTUXIMAB (Adcetris®)

Vous sera administré par perfusion intraveineuse.

### Quels sont les effets secondaires ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
<b>FREQUENTS</b>		
<b>Nausées, vomissements, perte d'appétit</b>	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements. Mangez lentement, et fractionnez les repas. Eviter les aliments gras, frits ou épicés.	Si les vomissements persistent pendant plus de 24h, prévenez le médecin.
<b>Picotement ou engourdissement des doigts et des orteils</b>		Communiquez avec l'infirmière ou le médecin si vous éprouvez de la douleur ou des ennuis avec le mouvement.
<b>Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, liés à la diminution du nombre de globules blancs dans le sang</b>	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenez immédiatement votre médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin et éventuellement une prescription d'antibiotiques seront effectués. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<b>Fatigue—Etourdissement, sensation ébrieuse</b>	Donnez-vous des priorités. Faites-vous plaisir. Prévoyez des temps de repos. Si vous pratiquez une activité physique, essayez de la maintenir.	Soyez à l'écoute de votre corps. Tentez de vous lever et de bouger lentement. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines. Prévenez votre médecin
<b>Diarrhée—Constipation Douleurs ou crampes au ventre</b>	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Surveillez votre poids régulièrement. Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), et les aliments faibles en fibres (les carottes, bananes...) En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement. Une adaptation de votre traitement pourra être nécessaire en cas de fièvre associée ou si diarrhées > 3 selles liquides par jour.
<b>Saignements inhabituels, hématomes, pétéchies (tâches rouges sur la peau), selles noires, liés à la baisse du nombre de plaquettes dans le sang, ou bleus inhabituels</b>	Attention aux coupures et blessures. Utilisez une brosse à dents souple Ne pas utiliser de thermomètre rectal. Les anti-inflammatoires type Aspirine, Ibuprofène... sont à éviter.	En cas de saignement, exercer une pression ferme pendant 10 à 15 minutes.  Avertir le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes.
<b>Eruption cutanée, peau sèche, démangeaisons</b>	Utilisez un savon doux et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil	En cas de symptômes persistants, contactez le médecin prescripteur.
<b>Mal de tête, douleur légère aux articulations, douleurs ou crampes</b>	Reposez vous souvent, mais de l'exercice léger est possible.	Prendre les médicaments analgésiques prescrits par votre médecin.

**Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr**

## Fiche Information Patient PROTOCOLE BRENTUXIMAB

### BRENTUXIMAB (Adcetris®)

Vous sera administré par perfusion intraveineuse.

### Quels sont les effets secondaires ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
<b>FREQUENTS</b>		
Difficultés à s'endormir	Essayez de maintenir des habitudes régulières de sommeil	Parlez en à votre médecin si cela vous dérange. Prudence en cas de conduite de véhicules.
Douleurs aux membres, durcissement d'une veine, problème de respiration, douleurs thoraciques, crachement de sang		Prévenez votre médecin et rendez-vous aux service des urgences.
Réaction à l'infusion		Prévenez votre médecin et rendez-vous aux service des urgences.
Confusion. Difficultés à réfléchir, parler, faire des mouvements.... Douleur accrue au ventre qui peut irradier au dos Douleurs au bas du dos, enflure du corps, miction faible ou absence d'urine		Prévenez votre médecin et rendez-vous aux service des urgences.



**BRENTUXIMAB** peut être nocif pour le fœtus. Vous ne devez pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte.

Vous ne devez pas allaiter pendant ce traitement.

Utilisez deux méthodes efficaces de contraception simultanément pendant la prise de ce médicament jusqu'à 6 mois après la dernière dose.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : [3c@ch-saintonge.fr](mailto:3c@ch-saintonge.fr)

# Fiche Information Patient PROTOCOLE BRENTUXIMAB

## Recommandations générales

### ⇒ BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité du traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci

### ⇒ HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

***Si vous fumez***, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections

***Eviter de boire de l'alcool***, le jour du traitement et quelques jours après. L'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales

***Protégez-vous des rayons du soleil*** : évitez de vous exposer, utilisez un écran total

***Les médicaments*** sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est conseillé aux hommes d'uriner en position assise afin d'éviter les projections. Le couvercle des toilettes doit être refermé avant de tirer la chasse d'eau. Nettoyer les toilettes après chaque utilisation avec un produit détergent. ! Ne pas utiliser d'eau de Javel (risque de formation de composés toxiques avec certains médicaments), sauf pour les patients recevant de la Mitomycine

***Surveillez régulièrement la zone cutanée*** autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, ou rougeur, prévenir l'équipe médicale

### ⇒ MEDICAMENTS ASSOCIES

***Ne prenez pas de médicament sans en parler à votre médecin***, même délivré sans ordonnance (comme l'Aspirine ou le Paracétamol)

***Pendant votre traitement***, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux.

***Informez votre oncologue*** référent des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie