

Fiche Information Patient CELL TOP® (Etoposide)

Qui peut prescrire CELL TOP® (Etoposide) ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer CELL TOP® (Etoposide) : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations :

- Capsules de couleur beige dosées à 25 mg (237,39 € la boîte de 40 capsules)
- Capsules de couleur rose dosées à 50 mg (185,21 € la boîte de 20 capsules)
- Capsules dosées à 100 mg (non remboursées par la sécurité sociale)



Comment prendre CELL TOP® (Etoposide) ? : Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



Les capsules de CELL TOP® sont à avaler entières, avec un verre d'eau, **à la même heure, au cours ou en dehors d'un repas, en 2 ou 3 prises par jour**.

Les capsules ne doivent pas être mâchées, sucées, écrasées, ou coupées. N'utilisez pas les capsules endommagées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de CELL TOP®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments, ne prenez pas la dose oubliée et **ne doublez pas la dose suivante**. Prenez la dose suivante habituellement prescrite et notez cet oubli dans le carnet de suivi.

Comment conserver CELL TOP® (Etoposide) ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les capsules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **CELL TOP® (Etoposide)**

Quels sont les effets secondaires du CELL TOP® (Etoposide) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires liés à la diminution des globules blancs	Limitez si possible les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
Saignements inhabituels liés à la diminution des plaquettes	Utilisez une brosse à dents souples. Eviter les anti-inflammatoires : Aspirine, Ibuprofène, ... Attention aux coupures et blessures. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.	En cas de saignements importants, contactez le médecin prescripteur.
Nausées, vomissements	Buvez plutôt entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	Le médecin pourra vous prescrire un traitement anti-émétique. Si les vomissements persistent après 24h, prévenez votre médecin.
Plaies douloureuses dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés ou irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlures, contactez le médecin prescripteur.