

Fiche Information Patient **ERIVEDGE® (Vismodegib)**

Qui peut prescrire ERIVEDGE® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer ERIVEDGE® ? : Chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

- Gélules de couleur rose et grise dosées à 150 mg
- Flacon de 28 gélules (6800 € le flacon)



Comment prendre ERIVEDGE® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respectez la dose prescrite par votre médecin. **La dose habituelle est de 150 mg soit une gélule par jour.**



Les gélules sont à avaler **entières avec un grand verre d'eau, en une seule prise par jour, pendant ou en dehors d'un repas, de préférence à la même heure de la journée.**

Les gélules ne doivent pas être ouvertes, écrasées, mâchées ou sucées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de ERIVEDGE®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié votre prise de médicaments ou en cas de vomissement : attendez la prise suivante et **ne doublez en aucun cas les quantités.**

Comment conserver ERIVEDGE® ?

Conserver les gélules à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient ERIVEDGE® (Vismodegib)



Evitez l'exposition prolongée **au soleil** et protégez-vous si vous devez le faire.



Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.



Le millepertuis sous toutes ses formes (tisanes, gélules, résine, gouttes,...) **est déconseillé.**



ERIVEDGE ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement est interdit pendant le traitement et au cours des 24 mois qui suivent la dernière dose. Les patientes doivent faire un test de grossesse dans les 7 jours précédant le début du traitement puis tous les 28 jours durant le traitement.



Utilisez 2 méthodes de contraception efficace pendant le traitement et au moins pendant 2 ans (pour les femmes) **et 2 mois** (pour les hommes) **après l'arrêt du traitement.**

Quels sont les effets secondaires de ERIVEDGE® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Douleurs articulaires, musculaires	Reposez-vous souvent. Faites des exercices légers, évitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.	Prenez un comprimé de Paracétamol si besoin. Informez votre médecin si les douleurs persistent.
Perte d'appétit, perte de goût, perte de poids	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Nausées, vomissements	Buvez entre les repas. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	Le médecin pourra vous prescrire un traitement anti-émétique. Si les vomissements persistent après 24h, prévenez votre médecin.
Diarrhée	Évitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin qui pourra vous prescrire un traitement.
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière.	Buvez 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, prévenir votre médecin qui pourra vous prescrire éventuellement un traitement par laxatifs.
Fatigue	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sagement). Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée.	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.
Démangeaisons	Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Évitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.