

## Fiche Information Patient INLYTA<sup>®</sup> (axitinib)

**Qui peut prescrire INLYTA<sup>®</sup> ?** : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

**Où se procurer INLYTA<sup>®</sup>** : chez votre pharmacien habituel.

**Formes/présentations:** boîte de 56 comprimés:

- Comprimé à 1 mg rouge ovale (786€ la boîte)
- Comprimé à 3 mg rouge rond (2277€ la boîte)
- Comprimé à 5 mg rouge triangulaire (3768€ la boîte)
- Comprimé à 7 mg rouge en losange (5259€ la boîte)



**Comment prendre INLYTA<sup>®</sup> ?** : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.

La posologie initiale est de **5 mg deux fois par jour** .

Des adaptations posologiques sont possibles par palier. Si le traitement est bien toléré, la dose initiale peut être augmentée à 7 mg puis à 10 mg ; 2 fois par jour. A l'inverse, en cas d'apparition d'effets indésirables, une diminution à 3 mg puis 2 mg ; 2 fois par jour peut être nécessaire.



INLYTA<sup>®</sup> se prend deux fois par jour à environ 12h d'intervalle, **pendant ou en dehors des repas**, avec un grand verre d'eau. Les comprimés ne doivent pas être broyés, écrasés ou coupés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de INLYTA<sup>®</sup>.



**En cas d'oubli** : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

**Comment conserver INLYTA<sup>®</sup> ?** :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

**Recommandations générales :**



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration** ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

## Fiche Information Patient INLYTA<sup>®</sup> (axitinib)



L'exposition au **soleil** n'est pas recommandée, protégez-vous avec un écran total, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.



**Le jus de pamplemousse** peut augmenter les effets indésirables de l'INLYTA<sup>®</sup>. A éviter.



Utilisez deux méthodes de **contraception** efficaces (préservatif + autre méthode) pendant le traitement et pendant une semaine après l'arrêt du traitement.

### Quels sont les effets secondaires de INLYTA<sup>®</sup> (Axitinib) ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
<b>Hypertension artérielle</b>	Surveillez votre tension artérielle selon le protocole indiqué par votre médecin.	Si vous ressentez des maux de tête, des palpitations, des sensations de vertiges ou des bourdonnements d'oreilles, contactez votre médecin. Si besoin, votre médecin pourra vous prescrire un médicament antihypertenseur.
<b>Nausées, vomissements, perte d'appétit</b>	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	En cas de symptômes persistants, prévenir le médecin. Un traitement spécifique contre les nausées est généralement associé à INLYTA <sup>®</sup> .
<b>Diarrhées</b>	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
<b>Fatigue</b>	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Reposez-vous souvent.	Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
<b>Sécheresse de la peau, picotements, gonflements, rougeur de la paume des mains et de la plante des pieds (syndrome main-pieds).</b>	Utilisez un savon doux sans parfum et une crème hydratante. Evitez l'exposition au soleil et le port de vêtements et de chaussures trop serrés.	Trempez vos mains et vos pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Une crème émolliente et des analgésiques peuvent vous être prescrits. Une adaptation posologique d'INLYTA <sup>®</sup> peut être nécessaire.