

Fiche Information Patient IRESSA® (Gefitinib)

Qui peut prescrire IRESSA® (Gefitinib) ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste ou compétent en cancérologie .

Où se procurer IRESSA® (Gefitinib) : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations :

- Comprimés ronds, bruns dosés à 250 mg : boîte de 30 comprimés (2287,89€)



Comment prendre IRESSA® (Gefitinib) ? : Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin.

La posologie habituelle est de **250 mg par jour en continu** (sans interruption).



Les comprimés doivent être pris entiers, avec un grand verre d'eau, **1 fois par jour au même moment, de préférence le matin**, avec ou sans aliment. Les comprimés ne doivent pas être croqués ou écrasés. **Si vous ne pouvez pas avaler le comprimé**, placez le dans un peu d'eau tiède. Mélangez jusqu'à ce qu'il se soit brisé en très petites particules (environ 5 minutes) et buvez sans attendre.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de Iressa®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments depuis moins de 12h, prenez la dose. Si cela fait plus de 12h, ne prenez pas la dose manquée. La dose manquée sera prise à l'heure habituelle le lendemain. En cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver IRESSA® (Gefitinib) ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; **prévenir immédiatement votre médecin** si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **IRESSA® (Gefitinib)**



Le millepertuis peut baisser l'efficacité de **IRESSA®**. Il est fortement déconseillé d'en consommer.



Utilisez deux méthodes de **contraception** efficaces (préservatif + autre méthode) pendant le traitement .

Quels sont les effets secondaires du IRESSA® (Gefitinib) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets indésirables	Prévention	Que Faire ?
Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, eau gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées, vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissement, rincez vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Plaies douloureuses dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés ou irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. Humidifiez la bouche avec un vaporisateur.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlures, contactez le médecin prescripteur.
Rougeur de la peau, acné, démangeaisons, assèchement..	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil, utilisez une protection solaire écran total.	L'apparition d'acné et l'éruption cutanée peuvent être prédictives de l'efficacité du traitement. Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager. En cas d'apparition de bulles sur la peau, arrêtez le traitement et contactez votre médecin.
Conjonctivite, sécheresse oculaire	Evitez les situations qui provoquent l'accentuation des symptômes : une atmosphère trop sèche ou enfumée ou de longues stations devant l'ordinateur, par exemple.	Faites un lavage oculaire au sérum physiologique. Instillez des larmes artificielles ou de gel plusieurs fois par jour.
Difficultés à respirer, toux, fièvre, douleur thoracique	Evitez les contacts avec les personnes malades.	Contactez rapidement votre médecin si les signes surviennent.