

## Fiche Information Patient NAVELBINE Oral (vinorelbine)

**Qui peut prescrire NAVELBINE® ? :** Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

**Où se procurer NAVELBINE® ?** Chez votre pharmacien habituel

**Formes et présentations :** 2 présentations sont disponibles

- Capsules molles de 20 mg (prix : 63€ la capsule)



- Capsules molles de 30 mg (prix : 92€ la capsule)



**Comment prendre NAVELBINE® ? :**

Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin



**Un bilan sanguin devra être effectué avant chaque prise**



Prise unique, **une fois par semaine**, à jour et à heure fixes

Les capsules sont prises **à la fin d'un repas léger ou d'une collation**, avec un grand verre d'eau, sans mâcher, ni sucer la capsule



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de Navelbine®



En cas d'oubli : Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.



**Comment conserver NAVELBINE® ? :**

Les capsules doivent être conservées au **réfrigérateur** (entre +2°C et +8°C)

**Recommandations générales :**



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration** ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les capsules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

## Fiche Information Patient NAVELBINE Oral (vinorelbine)



Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une **contraception efficace** durant le traitement, et jusqu'à 3 mois après le traitement



Les hommes doivent utiliser une **contraception efficace** durant le traitement et jusqu'à 3 mois après le traitement. Avant tout traitement, il est conseillé d'envisager de **conserver le sperme** à cause du risque d'infertilité irréversible .

### Quels sont les effets secondaires de la Navelbine® (Vinorelbine) ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
<b>FREQUENTS</b>		
<b>Signes d'infection : fièvre, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang</b>	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<b>Fatigue due à la chute des globules rouges dans le sang.</b>	Prévoyez des moments de repos. Fixez-vous des priorités.	Le signaler au médecin.
<b>Hématomes, ou saignements dus à la chute des plaquettes dans le sang.</b>	Attention aux coupures et blessures, utilisez une brosse à dents souple. Ne pas utiliser de thermomètre rectal.	En cas de saignement, exercez une pression ferme pendant 10 à 15 minutes. Avertissez le médecin si le saignement persiste plus de 15 minutes.
<b>Nausées, vomissements</b>	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, mangez lentement et fractionnez les repas. Evitez les aliments gras, frits et épicés.	Si les vomissements persistent, prévenez votre médecin.
<b>MOINS FREQUENTS</b>		
<b>Diarrhées</b>	Evitez les aliments épicés et frits. Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine.	Buvez beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenez le médecin.