

Fiche Information Patient **SUTENT®** (sunitinib)

Qui peut prescrire SUTENT® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer SUTENT® ? : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations : Boîte de 28 gélules. 3 dosages existent :

- 12,5 mg; orange (1344€ la boîte)
- 25 mg ; caramel et orange (2688€ la boîte)
- 50 mg ; caramel; (5348€ la boîte)



Comment prendre SUTENT® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



SUTENT® se prend **une fois par jour** en continu ou par cycles. Les gélules peuvent être prises au cours ou en dehors d'un repas et sont à avaler avec un grand verre d'eau. Les gélules ne doivent pas être croquées, ouvertes ou écrasées.

Les schémas suivants sont possibles:

- Cycle de 6 semaines: 50 mg par jour pendant 4 semaines consécutives, suivi d'une fenêtre thérapeutique de 2 semaines
- Schéma continu: 37,5 mg par jour, tous les jours.

La posologie peut être diminuée à 25 mg par jour ou augmentée jusqu'à 75 mg par jour.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de SUTENT®.



En cas d'oubli : Si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver SUTENT® ? :

Conserver les gélules à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **SUTENT® (sunitinib)**



L'exposition au **soleil** n'est pas recommandée, protégez-vous avec un écran total, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.



Certains aliments sont contre-indiqués (pamplemousse, réglisse).



Utilisez une **contraception** efficace pendant le traitement.

Quels sont les effets secondaires du SUTENT® (sunitinib) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Hypertension artérielle	Votre tension devra être surveillée.	Si besoin, votre médecin pourra prescrire un médicament antihypertenseur.
Diarrhées	Evitez les aliments épicés et frits. Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine.	Buvez beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenez le médecin.
Nausées, vomissements	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, mangez lentement et fractionnez les repas.	En parler au médecin ou à l'infirmière.
Modification du goût et infection dans la bouche (aphtes, mucite).	Brossez-vous régulièrement les dents avec une brosse à dent souple. Evitez les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac.	Votre médecin pourra vous prescrire un traitement adapté (bains de bouche....).
Coloration jaune de la peau réversible. Sécheresse de la peau. Rougeur et douleurs des mains et des pieds (syndrome main-pied)	Utilisez un savon doux sans parfum et une crème hydratante. Evitez l'exposition au soleil et le port de vêtements et de chaussures trop serrés.	Trempez vos mains et vos pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Une crème émolliente et des analgésiques peuvent vous être prescrits.
Fatigue	Anticipez les moments de fatigue et prévoyez des moments de repos. Se fixer des priorités.	Le signaler au médecin.