

Fiche Information Patient TARCEVA® (erlotinib)

Qui peut prescrire TARCEVA® (Erlotinib) ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste ou compétent en cancérologie.

Où se procurer TARCEVA® (Erlotinib) : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations :

- Comprimé rond et blanc à 25 mg : boîte de 30 comprimés (528€)
- Comprimé rond et blanc à 100 mg : boîte de 30 comprimés (1814€)
- Comprimé rond et blanc à 150 mg : boîte de 30 comprimés (2231€)



Comment prendre TARCEVA® (Erlotinib) ? : Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin.

1h avant



La posologie habituelle est de **150 mg par jour en continu** (sans interruption). Cette posologie peut être diminuée par votre médecin (100 mg ou moins).

Les comprimés doivent être pris au moins 1 heure avant un repas ou 2 heures après, avec un grand verre d'eau, **toujours à la même heure**. Les comprimés ne doivent pas être croqués ou écrasés.

2 h après



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de Tarceva®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver TARCEVA® (Erlotinib) ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.



Recommandations générales :



Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; **prévenir immédiatement votre médecin** si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **TARCEVA® (erlotinib)**



Fumer diminue l'efficacité du Tarceva®. Nous vous encourageons fortement à arrêter. Votre médecin peut vous prescrire un substitut nicotinique.



Certains aliments sont contre-indiqués (jus de pamplemousse, réglisse)

Utilisez deux méthodes de contraception efficaces (préservatif + autre méthode) pendant le traitement et pendant une semaine après l'arrêt du traitement.



Quels sont les effets secondaires du TARCEVA® (Erlotinib) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Fréquence	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Rougeur de la peau, acné, démangeaisons, assèchement..	Utilisez un savon doux et une crème émolliente. Evitez les expositions au soleil, et utilisez une protection solaire écran total.	L'apparition d'acné et l'éruption cutanée peuvent être prédictives de l'efficacité du traitement. Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Nausées, vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers.	En cas de vomissement, rincez vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, eau gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Difficultés à respirer, toux, fièvre	Eviter les contacts avec les personnes malades.	Contactez rapidement votre médecin si les signes surviennent.
Fatigue inhabituelle, maux de tête	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	Prudence en cas de conduite de véhicules.