

Fiche Information Patient TUKYSA® (Tucatinib)

Qui peut prescrire TUKYSA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer TUKYSA® ? : Disponible uniquement en pharmacie hospitalière.

Formes/présentations :

Comprimés dosés à 50 mg et 150 mg.



- 50 mg : comprimé pelliculé rond, jaune, portant l'inscription « TUC » sur la face et « 50 » sur l'autre face.
- 150 mg : comprimé pelliculé ovale, jaune, portant l'inscription « TUC » sur la face et « 150 » sur l'autre face.

Comment prendre TUKYSA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



Les comprimés de TUKYSA® **sont à avaler entiers avec un verre d'eau, en 2 prises par jour, à 12 h d'intervalle, tous les jours à la même heure, pendant ou en dehors des repas.**

Les comprimés ne doivent être ni mâchés, ni écrasés; ni coupés, ni dissous.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TUKYSA®.



En cas d'oubli ou de vomissement : ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la double. Pensez à le noter lors de la prochaine consultation.

Comment conserver TUKYSA® ? :



Conservez les comprimés à température ne dépassant pas les 30°C, hors de la vue et de la portée des enfants.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne sortez pas les comprimés de la boîte pour les mettre dans un pilulier.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient TUKYSA® (Tucatinib)

Interactions médicamenteuses :

GAVISCON, CARBOLEVURE, SMECTA : intervalle de 2 heures avec le TUKYSA

Anticoagulants oraux, GEMFIBROZIL.

ALLOPURINOL, RIFAMPICINE, CARBAMAZEPINE, Anti-fongiques azolés.

A éviter : pamplemousse, millepertuis, harpagophytum, camomille, gingembre, ginseng, thé vert, hibiscus, chardon marie (liste non exhaustive).



Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 1 semaine après la dernière prise.

Interrompre l'allaitement durant le traitement et jusqu'à 1 semaine après la dernière prise.

Quels sont les effets secondaires les plus fréquents de TUKYSA® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Nausées, vomissements.	Manger lentement et fractionner votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits, épicés. Buvez plutôt pendant les repas.	Ne pas reprendre la prise si vomissements.
Diarrhées	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2 L d'eau par jour. Privilégier une alimentation pauvre en fibres (féculents, carottes, bananes...). Evitez certains aliments qui peuvent augmenter le transit intestinal (café, boissons glacées, alcool, fruits –légumes crus, céréales, gras, épices...). Surveillez régulièrement votre poids.	En cas de diarrhées, privilégiez pâtes, riz, pommes de terre, carottes cuites, banane, gelée de coing...). Hydratez-vous régulièrement (bouillon de légumes, tisane, coca dégazé, eau minérale...);
Inflammation de la bouche	Ayez une bonne hygiène bucco-dentaire (brosse à dent souple, dentifrice non mentholé, non abrasif). Hydratez bien vos lèvres (demandez conseils à votre pharmacien surtout si vous êtes traité par oxygénothérapie. Entretenir la stimulation salivaire (glaçons, chewing-gums...).	Pratiquez de bains de bouche au bicarbonate de sodium 4 à 6 fois/j. Favorisez une alimentation fractionnée. Privilégiez les liquides et aliments mixés. Evitez l'alcool, le café, le tabac et les aliments pouvant être irritants.
Eruption cutanée	Utilisez un savon doux sans parfum et un agent hydratant (crème ou lait). Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Evitez les expositions au soleil (vêtements protecteurs, chapeau, écran solaire indice < 50).	Alertez votre médecin en cas de troubles cutanés.
Douleurs articulaires	Hydratez vous fréquemment. Prenez des temps de repos et faites des exercices légers (ex. marche). Evitez le mouvements répétitifs et les efforts physiques importants.	En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.
Saignements du nez	Des produits hémostatiques peuvent être utilisés pour réduire le temps de compression (ex : mèches à appliquer après 2 à 3 min de compression et laisser en place 30 min).	Pendant toute la durée du saignement, penchez la tête en avant et mouchez-vous jusqu'à évacuation des caillots. Exercer une légère pression sur vos narines pendant 10 minutes.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche,
une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs
3C@ch-saintonge.fr