

Fiche Information Patient TYVERB® (Lapatinib)

Qui peut prescrire TYVERB® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer TYVERB®?: chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

- Comprimés de couleur jaune dosés à 250 mg
- Boîte de 140 comprimés (2553 €)
- Boîte de 84 comprimés (1548 €)
- Boîte de 70 comprimés (réservé à l'usage hospitalier)






Comment prendre TYVERB®?: Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. La posologie est variable selon l'indication:

• 1250 mg (soit 5 comprimés) en une prise par jour, en continu, en association avec XELODA® de J1 à J14 d'un cycle de 21 jours. Vous ne devez pas prendre TYVERB® et XELODA® au même moment dans la journée.





- 1500 mg (soit 6 comprimés) en prise par jour, en continu, en association avec un inhibiteur de l'aromatase.
- 1000 mg (soit 4 comprimés) en une prise par jour, en continu, en association avec HERCEPTIN®.



Les comprimés sont à avaler entiers avec un verre d'eau, 1 heure avant ou 1 heure après le repas, tous les jours. Prenez votre traitement toujours au même moment de la journée et toujours au même moment par rapport aux repas.

Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TYVERB®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : Ne prenez pas la dose manquée, attendez la prise suivante et ne doublez pas les quantités.

Comment conserver TYVERB® ?:

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de tous vos médicaments (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.

V

Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.



Fiche Information Patient TYVERB® (Lapatinib)



Eviter la prise de millepertuis (Hypericum perforatum) sous toutes ses formes pendant le traitement par TYVERB®.



Le pamplemousse (jus et pulpe) est à éviter pendant votre traitement par TYVERB®.

Quels sont les effets secondaires de TYVERB® (Lapatinib) ?
Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vo	us n'en éprouviez aucun

The state of the s	The state of the s	
Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Consultez votre médecin traitant pour une ordonnance d'anti-diarrhéique et suivez la prescription. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. Prévenez votre médecin si les signes persistent (+ de 3 diarrhées par jour).
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une ali- mentation riche en fibre et une activité physique régulière.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, contac- tez votre médecin.
Nausées et vomissements	Mangez lentement et faites plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respec- tant les doses. Prévenez votre médecin si les signes per- sistent.
Plaies douloureuses dans la bouche	Evitez les aliments acides, épicés ou irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool.	En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlures, contactez le médecin prescripteur.
Syndrome main-pied: séche- resse de la peau, picotement, gonflement et rougeur des mains et des pieds, voire dou- leurs dans les mains et les pieds	Evitez toute exposition des mains et des pieds à la chaleur, et toute compression des extrémités (gants, chaussures trop serrées). Utilisez un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.	Trempez les mains et les pieds dans l'eau fraîche, puis séchez sans frotter. Appliquez des crèmes hydratantes sur les zones atteintes. Consultez votre médecin.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
Toux, douleurs thoraciques		Informez immédiatement votre médecin.
Fatigue inhabituelle	Respectez une bonne hygiène de vie : man- gez et buvez sainement. Reposez-vous beaucoup. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles.	Prudence en cas de conduite de véhicules

Ref: 3C-Inf/Form-063-V1-22/04/2015