

## Fiche Information Patient **VOTRIENT® (Pazopanib)**

**Qui peut prescrire VOTRIENT® (Pazopanib) ?** : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie .

**Où se procurer VOTRIENT® (Pazopanib)** : chez votre pharmacien habituel.

### Formes/présentations :

- Comprimés roses dosés à 200 mg dans des flacons de 30 cp (749,58 € le flacon)
- Comprimés blancs dosés à 400 mg dans des flacons de 30 cp (1460,86€ € le flacon) ou 60 cp (2814,28€ € le flacon)



**Comment prendre VOTRIENT® (Pazopanib) ?** : Votre posologie est **strictement individuelle**. Respectez la dose prescrite par votre médecin.

#### 1h avant



La posologie usuelle est de **800 mg, 1 fois par jour** . Elle pourra être ajustée par palier de 200 mg en fonction de la tolérance individuelle au traitement et ne devra pas excéder 800 mg. Les comprimés de VOTRIENT® sont à avaler entiers **tous les jours à la même heure** avec un grand verre d'eau, **au moins une heure avant et 2 heures après un repas**.

#### 2 h après

Les comprimés ne doivent pas être écrasés, mâchés ou sucés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de VOTRIENT®.



**En cas d'oubli** : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissement, **ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante**. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle le lendemain et notez cet oubli dans le carnet de suivi.

### Comment conserver VOTRIENT® (Pazopanib) ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

### Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses. Il est **déconseillé de consommer des tisanes à base de millepertuis** pendant le traitement.



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration** ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

## Fiche Information Patient **VOTRIENT® (Pazopanib)**



Le VOTRIENT® **ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement**. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer d'avoir recours à une **méthode de contraception efficace pendant toute la durée du traitement**. En cas de grossesse, la patiente doit être informée des risques potentiels pour le fœtus.



Evitez de consommer des **pamplemousses ou du jus de pamplemousse** pendant le traitement.



Le VOTRIENT® **peut altérer la cicatrisation des plaies**. En cas d'intervention chirurgicale programmée, il est recommandé d'**interrompre votre traitement 7 jours avant**.

### Quels sont les effets secondaires du VOTRIENT® (Pazopanib) ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
<b>Diarrhées</b>	Evitez les aliments épicés et frits.  Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine.	Boire au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes,...), les carottes, les bananes. <u>Si les diarrhées persistent plus de 48 heures</u> , prévenez le médecin.
<b>Nausées, vomissements</b>	Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements. Mangez lentement et fractionnez les repas.  Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Buvez entre les repas.	<u>En cas de vomissements</u> , rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. <u>Si les symptômes persistent</u> , prévenez votre médecin pour la mise en place d'un traitement spécifique.
<b>Perte d'appétit</b>	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas.	<u>En cas de perte de poids</u> , contactez votre médecin. Des compléments alimentaires pourront vous être prescrits.
<b>Hypertension artérielle avec maux de tête, palpitations, bourdonnements d'oreille</b>	La surveillance de votre cœur est primordiale, c'est pourquoi il faut respecter les examens à faire (ECG, et analyses sanguines). Mesurez régulièrement votre tension. Faites de l'exercice. Contrôlez votre poids. Limitez la consommation de sel et d'alcool.	Contactez votre médecin si ces signes surviennent.  Un traitement par anti-hypertenseur vous sera prescrit si besoin.
<b>Fatigue inhabituelle, maux de tête, douleurs articulaires, insomnie</b>	Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (mangez et buvez sainement). Reposez-vous souvent. Des exercices légers (marche) peuvent vous être utiles.	En cas de fatigue persistante inhabituelle ainsi que de violents maux de tête, informez votre médecin. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
<b>Troubles du goût</b>		Prévenez votre médecin en cas d'apparition de ces signes.