

Fiche Information Patient **XALKORI® (Crizotinib)**

Qui peut prescrire XALKORI® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie .

Où se procurer XALKORI® : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations :

- Gélule blanche et rose dosée à 200 mg
- Gélule rose dosée à 250 mg
- Boîte de 60 gélules (5777,10 € la boîte)



Comment prendre XALKORI® (Crizotinib) ? : Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



La posologie usuelle est de **250 mg, 2 fois par jour** (soit 500 mg/jr) **en continu**.

Les gélules de XALKORI® sont à avaler entières, de préférence avec de l'eau, **au cours ou en dehors d'un repas**. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.

Les gélules ne doivent pas être écrasées, dissoutes ou ouvertes



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de XALKORI®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments **ne doublez pas la dose suivante** :

Si la dose suivante est prévue dans **plus de 6 heures** : **prenez immédiatement** la dose oubliée.

Si la dose suivante est prévue dans **moins de 6 heures** : **ne prenez pas la dose oubliée**. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle et notez cet oubli dans le carnet de suivi.



Prudence en cas de conduite de machine ou de véhicule, XALKORI® peut entraîner des troubles de la vision, des étourdissements et de la fatigue.

Comment conserver XALKORI® ? :

Conserver les comprimés à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses. Il est **déconseillé de conseiller des tisanes à base de millepertuis** pendant le traitement.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient **XALKORI® (Crizotinib)**



Le XALKORI® **ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement**. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer et aux hommes d'avoir recours à une **méthode de contraception efficace pendant le traitement et 90 jours** au minimum après la fin de celui-ci.



Evitez de consommer des **pamplemousses ou du jus de pamplemousse** pendant le traitement.

Quels sont les effets secondaires du XALKORI® (Crizotinib) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires liés à la diminution des globules blancs	Limitez si possible les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans prescrits par votre médecin.	En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques.
Troubles visuels : vision double, floue, détériorée ou apparition de corps flottants	Soyez prudent en conduisant des véhicules ou en utilisant des machines	Informez votre médecin en cas d'apparition d'un de ces signes. Un examen ophtalmologique doit être envisagé si les troubles persistent ou s'aggravent.
Nausées, vomissements	Buvez plutôt entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.	Le médecin pourra vous prescrire un traitement anti-émétique. Si les vomissements persistent après 24h, prévenez votre médecin.
Diarrhée	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Un traitement préventif anti-diarrhéique est envisageable.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, eau gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin qui pourra vous prescrire un traitement.
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibre et une activité physique régulière.	Buvez 2 litres d'eau par jour. En cas de constipation prolongée, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire éventuellement un traitement par laxatifs.
Troubles cardiaques se manifestant par des étourdissements, évanouissements, douleur à la poitrine, fatigue, hypotension.	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension.	Prévenez immédiatement votre médecin dès l'apparition de ces signes.
Complication respiratoire	Des symptômes respiratoires non spécifiques tels qu'une toux ou une difficulté à respirer peuvent survenir.	Prévenir l'équipe médicale dès l'apparition de ces signes. Une adaptation de la dose ou un arrêt du traitement sont à envisager.