

Qui peut prescrire CALQUENCE® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste expérimenté en hématologie ou aux médecins compétents en maladie du sang. .

Où se procurer CALQUENCE® : Disponible uniquement en pharmacie hospitalière.

Formes/présentations :

- Boîte de 60 gélules de 100 mg dotées d'un corps jaune et d'une coiffe bleue, portant l'inscription « ACA 100 mg » à l'encre noire)



Comment prendre CALQUENCE® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. La posologie recommandée est de **100 mgX2 par jour, en continu**



Les gélules de CALQUENCE® sont à avaler entières, **en deux prises par jour, avec un verre d'eau (sans jus d'orange ou de jus de pamplemousse), de préférence à la même heure chaque jour, pendant ou en dehors du repas.**

Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ni dispersées, ni dissoutes.



En cas de vomissements, ne pas prendre de dose supplémentaires mais attendre la prise suivante. Adaptation des doses possibles à 100 mg X1/jour en fonction de la tolérance, d'association à un inhibiteur modéré des CYP3A4



En cas d'oubli : prendre la dose si retard < 3 heures

Comment conserver CALQUENCE® ? :

Conservation <25°C, ne pas déconditionner les gélules dans un pilulier

Recommandations générales :



Bilan biologique / NFS réguliers



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.



CALQUENCE® : Contraception obligatoire chez les femmes et les hommes durant le traitement. Allaitement contre indiqué.

Quels sont les effets secondaires de CALQUENCE® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Affections gastro-intestinales (nausées, vomissements, diarrhées, constipations, stomatite, douleurs abdominales)	Buvez fréquemment de l'eau fraîche, du colas dégazéifié, par petites gorgées entre les repas. Evitez les aliments frits, gras, épicés ou trop sucrés. Prenez des repas légers et fractionnés. Pratiquez une activité physique régulière.	Buvez au moins 2l d'eau par jour. Si les symptômes persistent parlez en à votre médecin
Cardio-vasculaire / FA / flutter Hématome, hémorragie, épistaxis		Surveillance ECG et ionogramme sanguin par votre médecin traitant
Céphalées, étourdissements, vertiges	Donnez vous des priorités. Faites-vous plaisir. Prévoyez des temps de repos. Si vous pratiquez une activité physique, essayez de la maintenir	Soyez à l'écoute de votre corps. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
Douleurs musculo squelettiques, arthralgie	Assurez vous d'avoir une literie adaptée, buvez régulièrement, privilégiez les exercices légers et évitez les gestes répétitifs	La chaleur (serviette chaude) peut vous apporter un soulagement local temporaire. Utilisez un antalgique (paracétamol) et consultez votre médecin traitant
Infections respiratoires	Limitez si possible les contacts avec les personnes ayant une infectoin contagieuse. Se laver souvent les mains	Contrôlez votre température et prevenez le médecin si elle est supérieure à 38°C
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil.	En cas de symptômes persistants, contactez le médecin prescripteur

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr