

Qui peut prescrire FARYDAK® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer FARYDAK® : disponible uniquement en pharmacie hospitalière.

Formes/présentations : boîte de 6 gélules opaques

- Vert clair dosées à 10 mg (4110€ la boîte)
- Orange dosées à 15 mg (4110€ la boîte)
- Rouge dosées à 20 mg (4110€ la boîte)



Comment prendre FARYDAK® ? : Votre posologie est **strictement individuelle**. Respecter la dose prescrite par votre médecin.

La posologie recommandée est de **20 mg 1 fois par jour, aux jours 1, 3, 5, 8, 10 et 12 d'un cycle de 21 j**



Les gélules de FARYDAK® se prennent **en une prise par jour, entières, avec un verre d'eau** au cours ou en dehors d'un repas. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure. Les gélules ne doivent **pas être ouvertes, ou mâchées**.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de FARYDAK®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments de **moins de 12 heures** avant la prochaine prise, **prenez la dose oubliée**. En cas d'oubli de **plus de 12 heures, ne prenez pas la dose oubliée**. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain, sans la doubler.

Comment conserver FARYDAK® ? :

Conserver les gélules à température ambiante < 30°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière, dans l'emballage d'origine et hors de vue et de portée des enfants.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses. **Informez votre dentiste des risques de saignements**



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.



Le millepertuis sous toutes ses formes (tisanes, gélules, résine, gouttes,...) **est déconseillé**.



Le pamplemousse (jus et pulpe) est déconseillé pendant toute la durée du traitement.



FARYDAK® est déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous êtes une **femme**, une **méthode efficace de contraception** doit être instaurée pendant toute la durée du traitement et être poursuivie pendant au moins 3 mois après l'arrêt du traitement. Si vous êtes un **homme**, vous devez prendre les précautions nécessaires jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.

Quels sont les effets secondaires de FARYDAK® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Surveillez votre poids régulièrement. Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement. Une adaptation de votre traitement pourra être nécessaire en cas de fièvre associée ou si diarrhées > 3 selles liquides par jour.
Fatigue, maux de tête	Respectez des temps de repos dans la journée et soyez à l'écoute de votre corps.	Pratiquez une activité physique adaptée et régulière. Si la fatigue persiste, parlez-en à votre médecin. Prudence en cas de conduite de véhicule.
Modification du bilan sanguin	Un bilan doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	En cas de doute, prenez votre température. En cas d'apparition de signes d'infection (fièvre, toux, maux de gorges), ou de saignements inhabituels , contactez votre médecin.
Perte d'appétit, perte de poids	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement. Buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajoutez du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en à votre médecin.
Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires	Limitez si possible les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Se laver souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. [Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.]

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr