

Fiche Information Patient GIOTRIF® (Afatinib)

Qui peut prescrire GIOTRIF® ? : Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en cancérologie.

Où se procurer GIOTRIF® ? : chez votre pharmacien habituel.

Formes/présentations:

- 20 mg, comprimé rond et blanc à jaunâtre portant la mention T20 (1870€)
- 30 mg, comprimé rond et bleu foncé portant la mention T30 (1870€)
- 40 mg, comprimé rond et bleu clair portant la mention T40 (1870€)
- 50 mg, comprimé ovale et bleu foncé portant la mention T50 (1870€)
- Boîte de 28 comprimés



Comment prendre GIOTRIF® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



-La posologie habituelle de GIOTRIF® est de **40 mg en une seule prise par jour**, de préférence chaque jour à la même heure.

-Ce médicament doit être pris sans nourriture. Aucune nourriture ne doit être prise au moins 3 heures avant et au moins 1 heure après la prise de ce médicament.

-Si vous avez du mal à avaler, il est possible de disperser le médicament dans 100 ml d'eau plate sans l'écraser, en agitant pendant 15 minutes maxi, boire immédiatement après et rincer le verre avec 100 ml d'eau qui seront également bus.

-Les comprimés ne doivent pas être croqués, ni coupés, ni écrasés.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de GIOTRIF®.

En cas d'oubli :



- Si vous avez oublié la prise de GIOTRIF® **depuis moins de 16h**, vous pouvez prendre la dose.

- Si vous avez oublié la prise de GIOTRIF® **depuis plus de 16h**, attendez la prise suivante et **ne doublez pas les quantités**.

Comment conserver GIOTRIF® ? :

Conserver les comprimés à température inférieure à 25°C.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient GIOTRIF® (Afatinib)

-  L'exposition au **soleil** n'est pas recommandée, protégez-vous avec un écran total, un chapeau, un vêtement à manches longues et des lunettes de soleil.
-  Utilisez une méthode de **contraception** efficace pendant le traitement et au moins 1 mois après la dernière dose.
-  Attention, ce médicament **contient du lactose**.

Quels sont les effets secondaires de GIOTRIF® (Afatinib) ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

| Effets secondaires | Prévention | Que Faire ? |
|---|--|--|
| Diarrhée | Evitez les aliments épicés et frits. Limitez la consommation de boisson contenant de la caféine, le lait, les légumes crus. | Buvez beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenez le médecin. En cas de perte de poids, prévenez le médecin. |
| Plaies douloureuses dans la bouche | Evitez les aliments acides, épicés ou irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. | En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlures, contactez le médecin prescripteur. |
| Troubles cutanés à type de démangeaisons, rougeur, acné ou sécheresse cutanée Infection de l'ongle | Préférez un savon doux sans alcool et un agent hydratant. Evitez les expositions prolongées au soleil. Utilisez une protection solaire écran total. Possibilité d'une prévention par antibiothérapie. | En cas de symptômes persistants ou gênants, prévenez le médecin. Des traitements médicaux peuvent vous soulager. |
| Troubles oculaires : larmoiements, sécheresse ou sensibilité à la lumière. | | Si ces troubles apparaissent, contactez votre oncologue. Le port de lentilles de contact n'est pas recommandé. |
| Diminution de l'appétit | Mangez ce que vous aimez en plusieurs petites collations par jour. Buvez beaucoup. | En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin. |
| Saignement de nez | | Prévenir votre médecin. En cas de saignement de nez, penchez la tête en avant en exerçant une légère pression sur vos narines. |

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs
3C@ch-saintonge.fr