

Qui peut prescrire TALZENNA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste expérimenté dans le traitement du cancer du sein.

Où se procurer TALZENNA® : Disponible en pharmacie de ville.

Formes/présentations :

- Boite de 30 gélules de couleur orange et blanc dosées à 1 mg (6100€ la boîte)
- Boite de 30 gélules de couleur jaune et blanc dosées à 0.25mg (2033€ la boîte)



Comment prendre TALZENNA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. La posologie recommandée est de **1mg par jour, soit 1 gélule de 1 mg.**



Les gélules de TALZENNA® sont à avaler entiers, **en une prise par jour, avec un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour, pendant ou en dehors du repas.**



Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.

Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TALZENNA®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments, ou en cas de vomissement, **pas de prise supplémentaire. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain.** Notez cet oubli dans le carnet de suivi.

Comment conserver TALZENNA® ? :

Conserver les comprimés dans son emballage d'origine et à l'abri de l'humidité.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses. **Informez votre dentiste des risques de saignements**



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.



TALZENNA® n'est pas recommandé pendant la grossesse ou l'allaitement. Chez les patients ayant des rapports sexuels avec des femmes en âge de procréer, un préservatif doit être utilisé associé à une autre méthode de contraception hautement efficace pendant le traitement et pendant les 4 mois qui suivent la dernière prise.

Quels sont les effets secondaires de TALZENNA® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
Diminution des globules blancs dans le sang servant à la lutte contre les infections Fatigue (anémie)	Limitez les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie. Reposez vous souvent	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C. Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.
Perte d'appétit, dysgueusie, nausées, vomissements	Mangez ce que vous aimez en plusieurs petites collations par jour. Buvez beaucoup. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement.	En cas de vomissement, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2h avant de manger. En cas de nausées, évitez la position allongée. En cas de symptôme persistants ou en cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Céphalées, vertiges		Informez votre médecin.
Chute des cheveux	Limitez les soins agressifs : teinture et permanente	Parlez-en à votre médecin, des solutions peuvent vous être proposées.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr
3c@ch-saintonge.fr