

Fiche Information Patient TASIGNA® (Nilotinib)

Qui peut prescrire TASIGNA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste en hématologie ou en oncologie médicale.

Où se procurer TASIGNA® ? : Chez votre pharmacien habituel

Formes/présentations:

- Gélules de couleur rouge dosées à 150 mg
(710€ la boîte de 28 gélules ; 2670€ la boîte de 128 gélules)
- Gélules de couleur jaune dosées à 200 mg
(934€ la boîte de 28 gélules ; 3516€ la boîte de 128 gélules)



Comment prendre TASIGNA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin.



Les gélules de TASIGNA® sont à avaler **entières avec un grand verre d'eau, au moins deux heures après le repas, en respectant 12 heures entre chaque prise. Essayez de ne rien manger pendant au moins une heure après la prise de TASIGNA®.**

Les gélules ne doivent pas être ouvertes, ou mâchées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de TASIGNA®.



En cas d'oubli : si vous avez oublié une prise de médicaments ou en cas de vomissements : **Ne prenez pas la dose manquée, attendez la prise suivante et ne doublez pas les quantités.** Merci de le noter dans votre carnet de suivi. Si vous oubliez TASIGNA® pendant plus d'un jour, prévenez votre médecin sans délai.

Comment conserver TASIGNA® ? : Ce médicament doit être **conservé à une température < à 25°C**, à l'abri de l'humidité. **Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.**

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient TASIGNA® (Nilotinib)



Le **millepertuis** sous toutes ses formes (tisanes, gélules, résine, gouttes,...) **est déconseillé**.



Il ne faut pas consommer de **pamplemousse ou de jus de pamplemousse** au cours du traitement.

Quels sont les effets secondaires de TASIGNA® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Douleurs musculaires et/ou articulaires Maux de tête	Faites des exercices légers comme de la marche.	En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique
Douleurs extrémités Symptômes cardiaques	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,...) et de votre tension.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.
Nausées, vomissements	Buvez entre les repas. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers. Écoutez vos envies : des aliments que vous aimez sont susceptibles de vous écœurer. Ainsi, vos prises alimentaires peuvent s'orienter vers des plats sucrés ou inversement vers des plats salés.	En cas de vomissement, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas de nausées, évitez la position allongée. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Eruptions cutanées	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Évitez les expositions au soleil.	En cas de symptômes persistants, contactez le médecin prescripteur.
Fatigue	Anticipez les moments de fatigue et prévoyez des moments de repos. Fixez-vous des priorités et soyez à l'écoute de votre corps.	Pratiquez une activité physique adaptée et régulière. Si la fatigue persiste, parlez-en à votre médecin.
Constipation	Privilégiez une bonne hydratation, une alimentation riche en fibres et une activité physique régulière.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour.
Œdèmes des membres	Élevez vos pieds lorsque vous êtes assis. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. Évitez les vêtements serrés.	Surveillez régulièrement votre poids : s'il augmente de façon rapide et inattendue, contactez votre médecin.
Diarrhées	Évitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, eau gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr