

**Qui peut prescrire VERZENIOS® ?** : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en **cancérologie**.

**Où se procurer VERZENIOS®** : Chez votre pharmacien habituel.

### Formes/présentations :

Boite de 14 comprimés (688€ la boîte) ou de 56 comprimés (2588€ la boîte) dosés à :

- 50 mg (de couleur beige),
- 100mg (de couleur blanche)
- 150mg (de couleur jaune)



**Comment prendre VERZENIOS® ?** : Votre posologie est strictement individuelle. Respecter la dose prescrite par votre médecin. La posologie recommandée est de **150 mg 2 fois par jour, soit 2 comprimés de 150 mg**.



Les comprimés de VERZENIOS® sont à avaler entiers, **en deux prise par jour (matin et soir), avec un verre d'eau, de préférence à la même heure chaque jour, pendant ou en dehors du repas**. Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de VERZENIOS®.



**En cas d'oubli** : si vous avez oublié une prise de médicaments, **prenez la dose manquée dès que possible le jour même. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain**. Notez cet oubli dans le carnet de suivi.

### Comment conserver VERZENIOS® ? :

Conserver les comprimés dans son emballage d'origine, à température ambiante inférieure à 25°C, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

### Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses. **Informez votre dentiste des risques de saignements**



**Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration** ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie tous les comprimés endommagés ou inutilisés, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

 **VERZENIOS® est déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement.** Utilisez une méthode contraceptive à double barrière telle que le préservatif et le diaphragme pendant tout le traitement et au moins jusqu'à 3 semaines après l'arrêt du traitement.

 **Le pamplemousse** (jus et pulpe) est à éviter pendant votre traitement par VERZENIOS®.

 **Le millepertuis peut baisser l'efficacité de VERZENIOS®.** Il est fortement déconseillé d'en consommer.

 Ce médicament contient du **lactose**

## Quels sont les effets secondaires de VERZENIOS® ?

*Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun*

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
<b>Diarrhées</b>	Évitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Surveillez votre poids régulièrement. Buvez au moins 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenir le médecin pour la mise en place d'un traitement. Une adaptation de votre traitement pourra être nécessaire en cas de fièvre associée ou si diarrhées > 3 selles liquides par jour.
<b>Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires</b>	Limitez si possible les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Se laver souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.	Contrôlez votre température et prévenez le médecin si elle est supérieure à 38°C.  [Un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire.
<b>Perte d'appétit, nausées, vomissements</b>	Buvez entre les repas. Évitez les aliments frits, gras ou épicés Mangez lentement Faites plusieurs petits repas légers	Si les vomissements ont lieu moins d'1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouvelez la prise. Si les vomissements persistent, prévenez votre médecin. Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique. Demandez les conseils d'une diététicienne.
<b>Rougeur de la peau, démangeaison, assèchement</b>	Utilisez : savon doux, agent hydratant, écran solaire total. Évitez les expositions prolongées au soleil.	En cas de symptômes persistants, contacter le médecin prescripteur. Des traitements médicaux peuvent vous soulager
<b>Fatigue</b>	Respectez des temps de repos dans la journée et soyez à l'écoute de votre corps.	Pratiquez une activité physique adaptée et régulière Si la fatigue persiste, parlez en à votre médecin
<b>Toxicité hépatique : selles pâles ou grasses, douleurs abdominales, jaunisse, démangeaison, urines foncées et douleurs musculaires</b>	Bilan hépatique à l'instauration du traitement (puis régulièrement en fonction de la tolérance)	Une adaptation du traitement pourra être discutée en fonction des résultats avec le spécialiste

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr