


Fiche Information Patient **ZYKADIA® (Céritinib)**

Qui peut prescrire ZYKADIA® ? : Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier spécialiste en oncologie ou compétent en cancérologie.

Où se procurer ZYKADIA® ? : En pharmacie de ville.

Formes/présentations:

- Gélules bleues et blanches dosées à 150 mg
- Boîte de 150 gélules (4911.01€)



Comment prendre ZYKADIA® ? : Votre posologie est strictement individuelle. Respectez la dose prescrite par votre médecin. La dose habituelle est de 450mg 1 fois par jour (soit 3 gélules).



Les gélules de ZYKADIA® sont à avaler **entières pendant le repas, en une prise par jour. Essayez de les prendre chaque jour à la même heure.**

Les gélules ne doivent être ni ouvertes, ni mâchées.



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de ZYKADIA®.



En cas d'oubli d'une prise de moins de 12 heures : **prenez la dose**

En cas d'oubli d'une prise de plus de 12 heures : **ne prenez pas la dose manquée.** La dose suivante sera prise à l'heure normale le lendemain, sans doubler la quantité. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.

En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire. Attendre la prise suivante.

Comment conserver ZYKADIA® ? : Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C. Gardez hors de vue et de portée des enfants.

Recommandations générales :



Parlez de **tous vos médicaments** (sans ordonnance, à base de plante, etc. ...) à votre médecin ou à votre pharmacien : il existe un risque d'interactions médicamenteuses.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration ; prévenir immédiatement votre médecin si vous êtes dans l'incapacité de continuer votre traitement.



Rapportez à votre pharmacie toutes les gélules endommagées ou inutilisées, ne les jetez pas dans la poubelle des ordures ménagères.

Fiche Information Patient ZYKADIA® (Céritinib)



Il est déconseillé de prendre ZYKADIA® pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes une femme, vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace, pendant le traitement et au moins 3 mois après son arrêt.



Evitez de consommer des **pamplemousses** ou du **jus de pamplemousse** pendant le traitement

Quels sont les effets secondaires du ZYKADIA® ?

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun

Effets secondaires	Prévention	Que Faire ?
FREQUENTS		
Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, les fruits et les légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.	Buvez au moins 2 litres d'eau par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, eau gazeuse) et privilégiez les féculents (riz, pâtes...), les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement.
Nausées, vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers. Ecoutez vos envies. Des aliments que vous aimez sont susceptibles de vous écœurer. Ainsi, vos prises alimentaires peuvent s'orienter vers des plats sucrés ou inversement vers des plats salés.	En cas de vomissement, rincez-vous la bouche à l'eau froide et attendez 1 à 2 heures avant de manger. En cas nausées, évitez la position allongée. En cas de symptômes persistants, prévenez le médecin pour la mise en place d'un traitement symptomatique.
Perte d'appétit	Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup.	Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel... Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin.
Fatigue, anémie	Anticipez les moments de fatigue et prévoyez des moments de repos. Fixez-vous des priorités et soyez à l'écoute de votre corps.	Pratiquez une activité physique adaptée et régulière. Si la fatigue persiste, parlez en à votre médecin.
Symptômes cardiaques	Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium, ...) et de votre tension.	Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes.
Modification du bilan sanguin	Un bilan doit être effectué régulièrement et les résultats communiqués à votre médecin	En cas de doute, prenez votre température. En cas d'apparition de signes d'infection (fièvre, toux, maux de gorges), ou de saignements inhabituels , contactez votre médecin.
Eruptions cutanées, démangeaisons	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil.	En cas de symptômes persistants, contactez le médecin prescripteur.

Malgré le soin apporté à la rédaction de cette fiche, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs. Merci de nous en informer par mail : 3c@ch-saintonge.fr