



Mode opératoire  
**Utilisation du Savène  
 lors d'une Extravasation  
 à une Anthracycline**

Références : 3C – SecChimio – 03

\*Version **01**

COMMISSION : Sécurisation des chimiothérapies

Page 1 / 5

**INTERVENANTS**

Créé/Révisé par		Relu par		Validé par	
G. HERBIN Pharmacien CH Saintonge	Date 17.05.13 Visa	S. CORDEL Pharmacien CH Royan	Date 17/05/13 Visa	L. CHASSIGNOL Médecin coordonnateur 3C CH Saintonge	Date 22/05/13 Visa
	Date Visa	S. VIOLETTE Pharmacien CH Royan	Date 13/07/13 Visa	F. VILLAR Médecin coordonnateur adjoint 3C Clinique Pasteur	Date 11/13 Visa
				E. Da CUNMA Directeur des soins CH Saintonge	DATE 5/12/2013 VISA
				P. FUNAY Directeur des Soins CH ROYAN	DATE 16/01/2014 VISA
				D. SLOMIANOWSKI Directeur des Soins CH JONZAC	DATE 6-1-14 VISA

**DESTINATAIRES POUR ATTRIBUTION ET/OU INFORMATION**

Établissements de Santé	Service(s) Spécialité(s)	ou	Personne(s) désignée(s)
<input checked="" type="checkbox"/> CH Royan <input checked="" type="checkbox"/> CH Saintonge <input checked="" type="checkbox"/> CH Jonzac	Service Qualité		Responsable

<b>MOTS CLÉS :</b>	<b>3C - Savène®, antidote, extravasation, anthracyclines</b>
--------------------	--

**SOMMAIRE**



- I. OBJET
- II. DOMAINE D'APPLICATION
- III. REFERENCES
- IV. GLOSSAIRE
- V. CONTENU
- VI. DOCUMENTS ASSOCIES
- VII. ANNEXES

\* Historique des modifications :

N° de Version	Date d'application	Nature de la modification	Validité jusqu'au
01	1/03/2013	Création	1/03/2016





			<b>Mode Opérateur</b> <b>Utilisation du Savène lors d'une Extravasation à une Anthracycline</b>
	Références : 3C – SecChimio – 03		Version <b>01</b>
	<b>COMMISSION : Sécurisation des chimiothérapies</b>		Page 3 / 5

- Jour 3 : 24h après la 2<sup>ème</sup> dose 500 mg/m<sup>2</sup>  
 Rq : dose maximale par 24 heures = 2000 mg

Au CH de Saintonge, la prescription se fera sur le logiciel CHIMIO (protocole « Savène extravasation anthracyclines »).

Au CH de Royan, la prescription se fera sur le logiciel ASCLEPIOS (protocole « Savène extravasation anthracyclines »).

### V-2 - Disponibilité et stockage des flacons

- 5 flacons de dexrazoxane 500mg (Savène®) et 2 flacons de diluant sont stockés à la PUI du CH de Saintonge (armoire de stockage dans salle de désinfection)
- 5 flacons de dexrazoxane 500mg (Savène®) et 1 flacon de diluant sont stockés à l'URC du GH La Rochelle-Ré-Aunis

Chaque centre possède le stock suffisant pour préparer le J1 ; le reste du kit devra être récupéré pour les jours suivants

- contact au GH de La Rochelle : tél. pharmacien URC : 05-46-45-88-70 ou 05-46-45-52-74
- sinon, pharmacien d'astreinte : standard du GH La Rochelle : 05-46-45-50-50

En cas de nécessité, le CH de Royan fera la demande de la mise à disposition au pharmacien du CH de Saintonge (qui se chargera de récupérer les flacons du GH La Rochelle)/

- Pharmacien UPAC CH Saintonge : 05-46-95-12-86 ou 05-46-95-12-93
- sinon, pharmacien d'astreinte : standard du CH de Saintonge : 05-46-95-15-15

### V-3 - Préparation



#### Pour le CH de Saintonge

Elle est assurée par l'Unité de Préparation des Anticancéreux aux heures d'ouverture (8h-15h30) et les samedis et dimanches matin (astreinte préparateur).

En dehors de ces horaires, le kit sera transmis aux IDE pour préparation dans le service de soins accompagné de dispositifs de reconstitution type système clos (annexe 1 : préparation et administration du Savène par les IDE).

#### Pour le CH de Royan

Elle est assurée par l'URC aux heures d'ouverture (9h-16h30 du lundi au vendredi) et par le pharmacien d'astreinte en dehors des heures d'ouverture de l'URC.

 <p>Centre Hospitalier de Saintonge</p>	 <p>Mode Opérateur</p> <p><b>Utilisation du Savène lors d'une Extravasation à une Anthracycline</b></p>	
	Références : 3C – SecChimio – 03	Version <b>01</b>
	COMMISSION : Sécurisation des chimiothérapies	Page 4 / 5

Rq : le dexrazoxane (savène®) est un agent cytotoxique. Ne pas faire manipuler les femmes enceintes.

#### V-4 - Facturation et commande d'un nouveau kit

Le Savène® est inscrit sur les listes hors GHS, mais n'est pas remboursé à 100% (240 € pour un flacon à 850€).

Dès l'utilisation du kit, un autre kit devra être commandé. Une fois réceptionné, la moitié des flacons devra être expédiée rapidement au GH de La Rochelle.

#### VI - DOCUMENTS ASSOCIES

PCD -3C – SecChimio –03 : Prévention, reconnaissance et gestion d'une extravasation de chimiothérapie anti-cancéreuse.

PCD-3C – SecChimio – 04 : Injection, Perfusion sur Chambre à Cathéter Implantable

#### VII - ANNEXES

Annexe 1 : préparation et administration d'une perfusion de Savène® par les IDE



## Mode Opérateur

### Utilisation du Savène lors d'une Extravasation à une Anthracycline

Références : 3C – SecChimio – 03

Version **01**

COMMISSION : Sécurisation des chimiothérapies

Page 5 / 5

## ANNEXE 1 : Préparation et administration d'une perfusion de Savène® par les IDE

### Préparation

- Étape 1 : calculer la dose par rapport à la surface corporelle
  - Jour 1 : 1000 mg/m<sup>2</sup>
  - Jour 2 : 1000 mg/m<sup>2</sup>
  - Jour 3 : 500 mg/m<sup>2</sup>
- Étape 2 : reconstituer la poudre Savène avec 25 ml d'eau ppi par flacon de 500 mg ; mélanger par inversion sans agiter ; la solution obtenue doit être légèrement jaune
- Étape 3 : retirer du flacon de diluant (en verre) l'équivalent du volume de Savène® à injecter (en fonction de la dose calculée)
- Étape 4 : injecter le volume de Savène reconstitué requis dans le flacon en verre

### Administration

L'administration du Savène doit se faire en perfusion intraveineuse pendant 1 à 2h dans une veine large située dans une extrémité/zone autre que celle affectée par l'extravasation.

Retirer au minimum 15 minutes avant le Savène les éventuels dispositifs de refroidissement

La 1<sup>ère</sup> perfusion doit commencer dès que possible et dans les 6 heures suivant l'extravasation.