



Dijon, le 15 janvier 2021

Objet : RECOMMANDATION DE LA FFCD promoteur d'essais thérapeutiques pour la vaccination contre le SARS-CoV-2

Chères équipes investigatrices,

La FFCD demande pour ses essais thérapeutiques de prendre en compte les recommandations publiées par le TNCD et accessible en ligne sur le site de la SNFGE.

Les recommandations chez les patients atteints de cancers digestifs et participant à un essai thérapeutique sont similaires aux autres patients atteints de cancers traités hors essai thérapeutique.

La FFCD est en faveur de la vaccination contre le SARS-CoV-2.

Ainsi les recommandations sont les suivantes :

- **Vaccination de tous les patients en l'absence de contre-indications** définitives ou temporaires (antécédents d'allergies à l'un des composants du vaccin, épisodes infectieux en cours, avis d'experts si poussée de maladie auto-immune ou anaphylaxie à autre vaccin ou de cause inconnue, infection aiguë documentée par la COVID-19 datant de moins de 3 mois et vaccination antigrippale de moins 3 semaines avant la vaccination contre la COVID-19).
- **Vaccination de tous les patients porteurs de cancers actifs, traités et/ou datant de moins de 3 ans.**
- **Utilisation préférentielle de vaccins basés sur l'utilisation de la séquence génétique du SARS-CoV-2**, notamment pour les vaccins à ARNm qui induisent une réponse immunitaire complète (humorale et cellulaire).
- **Les vaccins viraux réplicatifs sont contre-indiqués**
- **Si possible vacciner au moins 10 jours avant la première chimiothérapie** mais il n'y a pas de contre-indication à vacciner le jour de la première chimiothérapie.
- **Pour les patients déjà sous chimiothérapie**, effectuer la vaccination entre 2 cures, quelques jours avant une séance de chimiothérapie et éviter le NADIR.
- **Les modalités de vaccination chez les patients sous immunothérapie** sont identiques sauf en cas d'effet indésirable auto-immun sévère en cours qui feront différer la vaccination en attente de l'avis d'immunologiste ou interniste.
- **Il est fortement recommandé de vacciner aussi l'entourage immédiat** défini comme toute personne vivant sous le même toit et de vacciner l'entourage susceptible d'être en contact fréquent (famille, garde-malade...).