

LISTING DES ETUDES OUVERTES AUX INCLUSIONS : SEPTEMBRE 2026 URCCa

SEIN

-ASCENT05 : A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Adjuvant Sacituzumab Govitecan and pembrolizumab Versus Treatment of Physician's Choice in Patients With Triple Negative Breast Cancer Who Have Residual Invasive Disease After Surgery and Neoadjuvant Therapy

-ADELA : randomized phase 3, double-blind, placebo-controlled study of elacestrant plus everolimus versus elacestrant in patients with estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative, ESR1-mutated, advanced breast cancer progressing to endocrine therapy and CDK4/6 inhibitors.

-CAPPA : A Phase II study to evaluate CApecitabine plus Pembrolizumab as post-operative Adjuvant therapy for Triple Negative Breast Cancer with residual disease after neoadjuvant chemo-immunotherapy -COCO : constitution d'une cohorte nationale de patients atteints d'une maladie de Cowden et porteurs d'une altération constitutionnelle du gène PTEN pour évaluation prospective de risque de cancer.

-DESTINY DS8201-0005-NIS-MA : An ambispective, non-interventional study (NIS) with trastuzumab deruxtecan for patients with HER2-low expressing unresectable and/or metastatic breast cancer

-ELEGANT : Comparaison entre l'élacéstrant et l'hormonothérapie standard chez des femmes et des hommes atteints d'un cancer du sein précoce à risque élevé de récurrence, présentant une atteinte ganglionnaire, positif pour les récepteurs d'oestrogènes et HER2 négatif : étude de phase 3 internationale, multicentrique, randomisée et en ouvert (suspension pour amendement)

-ETNA : Adjuvant pembrolizumab or surveillance in Early Triple Negative breast cancer with high stromal tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) score phase 2

- HEROES : De-escalation of medical therapies in HER2-positive metastatic breast cancer in long-term persistent response and minimal residual disease undetectable in circulating tumor DNA
- ICARUS : Phase 2, Open label Study of Patritumab Deruxtecan (U3-1402), an Anti-HER3-Antibody Drug Conjugate (ADC), in patients with Advanced Breast Cancer, with biomarker analyses to characterize response to therapy

-NOLEETA : Retrait de la chimiothérapie dans le cancer du sein précoce à risque intermédiaire RH+ HER2- traité par Ribociclib (LEE011) en situation adjuvante, essai de phase III de non-infériorité- phase III

- -OPTIMA YOUNG : Optimal Personalized Treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis: focus on YOUNGER women
- -REBECCA: Real-world Early BrEast CanCer mAnagement - Etude observationnelle, prospective, multicentrique, de patients adultes atteints de cancer du sein HER2 négatif à un stade précoce et traités par olaparib en vie réelle en France 2025
- REPARP : Prospective and multicentric study evaluating DNA double-strand breaks (DSBs) REpair factors (POLQ, Shieldin complex and 53BP1) expression as biomarker of PARP inhibitor resistance in patients with deleterious germline mutation in BRCA 1/2 and HER2-negative, metastatic or locally advanced breast cancer phase NC
- *-TRAK-ER : A randomized trial of early detection of molecular relapse with circulating tumour ADN tracking and treatment with palbociclib plus fulvestrant vs standard endocrine therapy in patients with ER+ HER2- breast cancer- phase 2 (sous réserve de réouverture du promoteur)*
- TREAT-CTDNA : Élacéstrant pour le traitement des patients atteints d'un cancer du sein ER+/HER2- avec rechute selon l'ADNtC

OVAIRE/UTERUS/ COL UTERIN

- ATROVA : Détection des mutations des gènes de la voie de recombinaison homologue dans l'ADN tumoral circulant de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avec mutation d'un gène BRCA et recevant en première ligne un traitement de maintenance par inhibiteur de PARP

BFR ESS : Etude de phase 2 randomisée comparative prospective multicentrique Évaluant l'impact Clinique de l'interruption vs le maintien d'un traitement par inhibiteur de l'aromatase, chez des patientes atteintes d'un sarcome du stroma endométrial de bas grade localement avancé ou métastatique

-BLUE STAR : A Phase III, Randomized, Open-Label, Multicenter, Global Study of Puxitatu Samrotecán (AZD8205) Monotherapy versus Physician's Choice of Chemotherapy in Participants with B7-H4-Selected Advanced/Metastatic Endometrial Cancer Who Progressed On or After Platinum-Based Chemotherapy and Anti-PD-1/Anti-PD-L1 Therapy (BLUESTAR-Endometrial01)

-FLORENZA M25-709 – Sous-étude 1 : Étude randomisée, en ouvert, multicentrique, de phase II évaluant le Mirvétuximab Soravtansine en association avec le bévécizumab, par rapport au bévécizumab seul, en traitement d'entretien chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, d'un cancer des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primitif exprimant le récepteur α du folate et avec une capacité de recombinaison homologue, dont la maladie n'a pas progressé pendant ou immédiatement après une chimiothérapie de première ou deuxième ligne à base de platine en association avec le bévécizumab

-FLORENZA M25-709- Sous-étude 2 - Étude randomisée, en ouvert, multicentrique, de phase II, conçue pour évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi du Mirvétuximab Soravtansine en association avec le carboplatine, suivi d'une monothérapie par mirvétuximab soravtansine, chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire séreux de haut grade, d'un cancer des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primitif sensible au platine, en récurrence (2L et 3L) et exprimant le récepteur α du folate

-NIRVANA : A randomized study of paclitaxel carboplatine followed by maintenance niraparib compared to paclitaxel carboplatine bevacizumab followed by niraparib+bevacizumab in patients with advanced ovarian cancer following a front line complete cytoreductive surgery (phase II)

-PAROLA : Lymphadénectomie para-aortique dans les cancers du col de l'utérus localement avancés phase 3

-PEMBROSSCHOT : Etude de phase 3 multicentrique, évaluant le pembrolizumab en combinaison à une CT à base de PAVEP en première intention chez des patientes atteintes d'un carcinome à petites cellules avancé de l'ovaire Stades II-IV de type hypercalcémique

- RAINBO RED : Traitement adjuvant ciblé dans le cancer de l'endomètre Basé sur les caractéristiques moléculaires, essais de la plateforme TransPORTEC - p53abn - RED phase 3
- ROSCAN : An international multicentric randomized phase II evaluating dostarlimab in combination with niraparib versus niraparib alone compared to chemotherapy in the treatment of metastatic or recurrent endometrial or ovarian carcinosarcoma after at least one line of chemotherapy

-SALVOVAR : A pragmatic randomized phase III trial to assess the utility of adjusting chemotherapy dose & dosing schedule with the SALVage weekly dose-dense regimen in patients with poor prognostic OVARian cancers based on the tumor unfavorable primary chemosensitivity and incomplete debulking surgery. ARCAGY GINECO

-TMRG : observatoire des tumeurs rares gynécologiques

-TROFUSE 21 : Phase 3, Randomized, Open-label, Multicenter Study of MK-2870 Maintenance With or Without Bevacizumab Versus Standard of Care in Participants With Newly-Diagnosed Advanced HRD-Negative Ovarian Cancer Following First-line Platinum-based Chemotherapy (TroFuse-021/GOG-3102/ENGOT-ov85)

-TROFUSE 36 : A Phase 3, Randomized, Open-label, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Sacituzumab Tirumotecan (MK-2870) in Combination With Pembrolizumab With or Without Bevacizumab Compared With Standard of Care as First-line Maintenance Treatment for Participants With Persistent,

ORL

- **REFCOR** : Réseau d'expertise français sur les cancers ORL rares
- **NPARO** : *Evaluation de la prise en charge ganglionnaire des cancers parotidiens (sous réserve de confirmation du promoteur)*

ETUDES TRANSVERSES ET ONCOGENETIQUE

- **COCO** : *constitution d'une cohorte nationale de patients atteints d'une maladie de Cowden et porteurs d'une altération constitutionnelle du gène PTEN pour évaluation prospective de risque de cancer.(sous réserve de réouverture du CRF)*
- **COFAT2** : cohorte de familles ATM (sous réserve de cas index)
- **COVAR** : var. BRCA1/2 de signification inconnue (sous réserve de résultat délivré en laboratoire agréé)
- **GEMO** : *Recherche de gènes modificateurs des risques tumoraux chez les sujets portant une mutation BRCA1 ou BRCA2 (suspension interne jusqu'à novembre)*
- **GENEPSO** : *prédispositions génétiques aux tumeurs du sein et de l'ovaire-Etude prospective de sujets porteurs d'une mutation BRCA- (en attente de validation de convention)*
- POLE**: cohorte prospective multicentrique des tumeurs avec mutation POLE
- **TCF** : Caractérisation clinique, anatomo-pathologique et génétique des patients atteints de Tumeurs Carcinoïdes Familiales de l'intestin grêle