

Score O-RADS™ IRM

Score	Catégorie de risque	VPP malignité	Description du lexique
0	Evaluation incomplète	N/A	N/A
1	Ovaires normaux	N/A	<p>Pas de lésion ovarienne</p> <p>Follicule défini comme un kyste simple ≤ 3 cm chez la femme non ménopausée</p> <p>Kyste hémorragique ≤ 3 cm chez la femme non ménopausée</p> <p>Corps jaune \pm hémorragique ≤ 3 cm chez la femme non ménopausée</p>
2	Certainement bénin	$< 0,5 \%^1$	<p>Kyste : uniloculaire - quel que soit le type de liquide</p> <p>Pas de rehaussement pariétal</p> <p>Pas de portion tissulaire²</p> <p>Kyste : uniloculaire - liquide simple ou endométriosique</p> <p>Rehaussement pariétal lisse</p> <p>Pas de portion tissulaire</p> <p>Lésion de contenu grasseux³</p> <p>Pas de portion tissulaire</p> <p>Portion tissulaire "noir T2/noir DWI"</p> <p>Hyposignal homogène T2 et DWI</p> <p>Trompe dilatée - contenant un liquide simple :</p> <p>Fin, paroi lisse/plis endotubaires avec rehaussement</p> <p>Pas de portion tissulaire</p> <p>Kyste para-ovarien - quel que soit le type de liquide</p> <p>Fin, paroi lisse \pm rehaussement</p> <p>Pas de portion tissulaire</p>
3	Faible risque	$\approx 5 \%^1$	<p>Kyste : uniloculaire - contenu protéique, hémorragique ou mucineux⁴</p> <p>Rehaussement pariétal lisse</p> <p>Pas de portion tissulaire</p> <p>Kyste : multiloculaire - quel que soit le type de liquide, sans contenu grasseux</p> <p>Septums lisses et rehaussement pariétal</p> <p>Pas de portion tissulaire</p> <p>Lésion avec portion tissulaire (excluant noir T2/noir DWI)</p> <p>Courbe de rehaussement de faible risque</p> <p>Trompe dilatée :</p> <p>Liquide non simple : paroi fine/plis</p> <p>Liquide simple : épais, paroi lisse/plis</p> <p>Pas de portion tissulaire</p>
4	Risque intermédiaire	$\approx 50 \%^1$	<p>Lésion avec portion tissulaire (excluant noir T2/noir DWI)</p> <p>Courbe de rehaussement de risque intermédiaire</p> <p>Si courbe de rehaussement non réalisable, score 4 pour toute lésion avec une portion solide de rehaussement \leq au myomètre à 30-40 secondes sur les acquisitions non dynamiques</p> <p>Lésion contenant de la graisse</p> <p>Importante portion tissulaire rehaussée</p>
5	Haut risque	$\approx 90 \%^1$	<p>Lésion avec portion tissulaire (excluant noir T2/noir DWI)</p> <p>Courbe de rehaussement de haut risque</p> <p>Si courbe de rehaussement non réalisable, score 5 pour toute lésion avec une portion solide de rehaussement inférieur au myomètre à 30-40 secondes sur les acquisitions non dynamiques</p> <p>Épaississement irrégulier ou nodules péritonéaux, mésentérique ou de l'omentum avec ou sans ascite</p>

¹Valeurs prédictives positives (VPP) approximatives fondées sur les données de Thomassin-Naggara, et al. Ovarian-Adnexal Reporting Data System Magnetic Resonance Imaging (O-RADS™ MRI) score for risk stratification of sonographically indeterminate adnexal masses. JAMA Network Open 2020 ; 3(1) : e1919896.

A noter que la VPP fournie s'applique à la catégorie de score dans son ensemble et non aux caractéristiques individuelles. Les VPP définitives ne sont actuellement pas disponibles pour les caractéristiques individuelles. Les VPP de malignité comprennent à la fois les tumeurs frontières et les cancers invasifs.

²Une portion tissulaire est définie comme une lésion rehaussée qui se conforme à une des morphologies suivantes : végétation, nodule mural, septums ou parois irrégulières ou autre volumineuse portion solide.

³Le rehaussement du nodule de Rokitansky dans une lésion contenant de la graisse ne change pas son classement en IRM O-RADS™ 4.

⁴Un kyste hémorragique ≤ 3 cm chez les femmes non ménopausées est IRM O-RADS™ 1.

Source : traduction de l'American College of Radiology. Reproduit avec autorisation.