

DACARBAZINE

Déticène® et génériques

Version 2026

① PRÉSENTATION DE LA PRÉPARATION IV faite par l'URC

- Solvant : NaCl 0,9%
- Conservation : température ambiante ou froid et à l'abri de la lumière

② VOIE d'ADMINISTRATION

Voie **INTRAVEINEUSE LENTE**

③ DOSE MAXIMALE PAR INJECTION

375 mg/m²

④ EXAMENS NÉCESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- NFS
- Ionogramme, créatininémie (si patient à risque d'insuffisance rénale)
- Bilan hépatique (si patient à risque d'insuffisance hépatique)

⑤ CONTRE INDICATIONS :

- Maladie hépatique et/ou rénale sévère

⑥ SOINS DE SUPPORT

- Antiémétique : potentiel émétisant très fort (> 90 %) : sétron + dexaméthasone + apripitant
- Prévenir l'exposition au soleil : utilisation écran total dans les jours suivants le traitement

⑦ EFFET INDÉSIRABLES

- Toxicité digestive : vomissements (immédiats mais parfois retardés dans les 12h)
- Photosensibilisation
- Syndrome pseudo-grippal (hyperthermie, myalgie) : apparaît en 7j
- **Extravasation** du produit : risque majeur de nécrose
Produit **VESICANT** +++
En cas d'extravasation, se référer à la fiche « Extravasation d'anticancéreux »



⑧ SURVEILLANCE

Cutanée locale au point d'injection : recherche d'extravasation

⑨ EXTRAVASATION

Risque majeur de nécrose : **produit VÉSICANT**

En cas d'extravasation, se référer à la fiche « Extravasation d'anticancéreux »



Veillez à valider les étapes « en cours d'administration » et « administré » sur le logiciel Chimio® !