

ACTINOMYCINE – DACTINOMYCINE Cosmegen®

Version 2026

① PRESENTATION DE LA PRÉPARATION IV faite par l'URC

- Solvant : glucose
- Conservation : froid et à l'abri de la lumière

② VOIE d'ADMINISTRATION

Voie **INTRAVEINEUSE** stricte

Perfusion la plus courte possible pour éviter le risque d'extravasation

③ DOSE MAXIMALE PAR INJECTION



2 mg par injection

④ EXAMENS NÉCESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- ÉLÉMENTS CLINIQUES : hépatomégalie ou hépatalgie, nausées, prise de poids, pétéchies (recherche MVO)
- EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :
 - NFS, plaquettes
 - Transaminases (<10N)

⑤ INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES MAJEURES



RADIOSENSIBILISANT et photosensibilisant

A suspendre avant, pendant et après la radiothérapie

⑥ CONTRE-INDICATIONS

Radiothérapie

⑦ SOINS DE SUPPORT

- Antiémétiques : potentiel émétisant fort (30 - 90 %) : bithérapie avec sétron + aprépitant ou sétron + dexaméthasone
- Prévenir l'exposition au soleil : utilisation écran total dans les jours suivants le traitement

⑧ EFFETS INDÉSIRABLES

- **Maladie Veino-Occlusive** : hépatomégalie douloureuse, thrombopénie (par consommation), prise de poids, ↑ des transaminases
- Nausées, vomissements (fréquent et retardés), diarrhée, mucite (fréquent)
- Cutané : rash, érythème, photosensibilisation (retardée)
- **Extravasation** du produit : risque majeur de nécrose



Produit **VÉSICANT +++**

En cas d'extravasation, se référer à la fiche « Extravasation d'anticancéreux »

⑨ SURVEILLANCE

- Bilan hépatique
- Surveillance cutanée
- État nutritionnel

⑩ EXTRAVASATION

Risque majeur de nécrose : produit **VÉSICANT**

En cas d'extravasation, se référer à la fiche « Extravasation d'anticancéreux »



Veillez à valider les étapes « en cours d'administration » et « administré » sur le logiciel Chimio® !