

ACTUALISATION RCA-RESILIAENCE 2011 (03/02/2011)
ENTRETIEN DES VOIES VEINEUSES CENTRALES (KTSC ET PAC)

- En cas d'absence de retour sanguin :
 - 1) Rincer avec 10 à 20 ml de sérum physiologique par petites pressions (utiliser une seringue d'un volume supérieur ou égal à 10ml pour éviter une surpression).
 - 2) Utiliser l'UROKINASE (fibrinolytique), **sur prescription médicale uniquement**.
 - 3) Radio pulmonaire de contrôle

- En cas de passage impossible :
 - 1) Changer d'aiguille de PAC si chambre implantable.
 - 2) Utiliser l'UROKINASE en tentant de la faire pénétrer par petites pressions avec une seringue d'un volume supérieur ou égal à 10ml (pour éviter une surpression).
 - 3) Radio pulmonaire de contrôle.

ATTENTION : si PAC ou KTSC posé depuis moins d'une semaine : **PAS D'UTILISATION D'UROKINASE** sans vérification clinique et radiologique.

- En cas de non utilisation du KTSC de façon continue :

Rincer avec 20 ml de sérum physiologique par petites pressions en adaptant la seringue luer-lock à la valve bidirectionnelle.

S'assurer de la présence et de l'intégrité de la valve bi-directionnelle.

NE PLUS FAIRE DE VERROU HEPARINE à 1000UI POUR FERMER LA VOIE.