Études cliniques et registres en cours d'inclusion

URCCa · Octobre 2026 · Sein · Gynécologie · ORL · Oncogénétique

28
études ouvertes aux inclusions

	LOCALISÉ · 1re LIGNE · ADJUVANT		RECHUTE · MÉTASTATIQUE		COHORTES · REGISTRES
SEIN	ASCENT05	CAPPA	ADELA	ICARUS	REBECCA
	ETNA ▼ DÉSESCALADE	NOLEETA ▼ DÉSESCALADE	HEROES ▼ DÉSESCALADE	ALTER	REPARP
	OPTIMA YOUNG	TREAT-CTDNA			
OVAIRE	NIRVANA	SALVOVAR	FRAmework-01 Rechute platine-sensible ou -	PEMBROSSCHOT	ATROVA
	PEMBROSSCHOT	FLORENZA 1	FLORENZA 1		TMRG
UTÉRUS corps ou col	RAINBO RED	PAROLA	BLUE STAR	ROSCAN	*Pas d'étude ouverte*
ORL			*Pas d'étude ouverte*		NPARO REFCOR
TRANSVERSE ONCOGÉNÉTIQUE	POLE	TCF		COFAT2	

▼ DÉSESCALADE essai de désescalade thérapeutique TN = triple négatif · ADNtc = ADN tumoral circulant · = inhibiteur de CDK4/6 · iPARP = inhibiteur de PARP · Intitulés complets des études : voir page 2

Un dossier à analyser ? Contact URCCa : sandrine.lavau-denes@chu-limoges.fr · Urgence : poste **87009**

Intitulés complets des études ouvertes URCCa · Octobre 2026 ·

SEIN

ADELA	Randomized phase 3, double-blind, placebo-controlled study of elacestrant plus everolimus versus elacestrant in patients with estrogen receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative, ESR1-mutated, advanced breast cancer progressing to endocrine therapy and CDK4/6 inhibitors.
ALTER	A Phase 2, Multicenter, Randomized, Open-label trial assessing sacituzumab-govitecan and trastuzumab-deruxtecan combinations in an ALTERnating regimen for patients with metastatic or locally advanced HER2-low triple-negative breast Cancer.
ASCENT05	A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Adjuvant Sacituzumab Govitecan and pembrolizumab Versus Treatment of Physician's Choice in Patients With Triple Negative Breast Cancer Who Have Residual Invasive Disease After Surgery and Neoadjuvant Therapy.
CAPPA	A Phase II study to evaluate CAPecitabine plus Pembrolizumab as post-operative Adjuvant therapy for Triple Negative Breast Cancer with residual disease after neoadjuvant chemo-immunotherapy.
ETNA	Adjuvant pembrolizumab or surveillance in Early Triple Negative breAst cancer with high stromal tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) score – phase 2.
HEROES	De-escalation of medical therapies in HER2-positive metastatic breast cancer in long-term persistent response and minimal residual disease undetectable in circulating tumor DNA.
ICARUS	Phase 2, Open label Study of Patritumab Deruxtecan (U3-1402), an Anti-HER3-Antibody Drug Conjugate (ADC), in patients with Advanced Breast Cancer, with biomarker analyses to characterize response to therapy.
NOLEETA	Retrait de la chimiothérapie dans le cancer du sein précoce à risque intermédiaire RH+ HER2- traité par Ribociclib (LEE011) en situation adjuvante, essai de phase III de non-infériorité.
OPTIMA YOUNG	Optimal Personalized Treatment of early breast cancer using Multi-parameter Analysis: focus on YOUNGer women.
REBECCA	Real-world Early BrEast CanCer mAnagement – Étude observationnelle, prospective, multicentrique, de patients adultes atteints de cancer du sein HER2 négatif à un stade précoce et traités par olaparib en vie réelle en France (2025).
REPARP	Prospective and multicentric study evaluating DNA double-strand breaks (DSBs) REpair factors (POLQ, Shieldin complex and 53BP1) expression as biomarker of PARP inhibitor resistance in patients with deleterious germline mutation in BRCA 1/2 and HER2-negative, metastatic or locally advanced breast cancer.
TREAT-CTDNA	Élacestrant pour le traitement des patients atteints d'un cancer du sein ER+/HER2- avec rechute selon l'ADNtc.

ORL

NPARO	Évaluation de la prise en charge ganglionnaire des cancers parotidiens.
REFCOR	Réseau d'expertise français sur les cancers ORL rares.

TRANSVERSE · ONCOGÉNÉTIQUE

COFAT2	Cohorte de familles ATM (sous réserve de cas index).
POLE	Cohorte prospective multicentrique des tumeurs avec mutation POLE.
TCF	Caractérisation clinique, anatomo-pathologique et génétique des patients atteints de Tumeurs Carcinoïdes Familiales de l'intestin grêle.

OVAIRE · UTÉRUS (CORPS OU COL)

ATROVA	Détection des mutations des gènes de la voie de recombinaison homologue dans l'ADN tumoral circulant de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avec mutation d'un gène BRCA et recevant en première ligne un traitement de maintenance par inhibiteur de PARP.
BLUE STAR	A Phase III, Randomized, Open-Label, Multicenter, Global Study of Puxitatug Samrotecan (AZD8205) Monotherapy versus Physician's Choice of Chemotherapy in Participants with B7-H4-Selected Advanced/Metastatic Endometrial Cancer Who Progressed On or After Platinum-Based Chemotherapy and Anti-PD-1/Anti-PD-L1 Therapy (BLUESTAR-Endometrial01).
FLORENZA M25-709 – sous-étude 1	Étude randomisée, en ouvert, multicentrique, de phase II évaluant le mirvétuximab soravtansine en association avec le bévacizumab, par rapport au bévacizumab seul, en traitement d'entretien chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire, d'un cancer des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primitif exprimant le récepteur α du folate et avec une capacité de recombinaison homologue, dont la maladie n'a pas progressé pendant ou immédiatement après une chimiothérapie de première ou deuxième ligne à base de platine en association avec le bévacizumab.
FRAmework-01	Étude de phase 3 en deux parties comparant le sofétabart mipitécan (LY4170156) à la chimiothérapie ou au mirvétuximab soravtansine dans le cancer de l'ovaire résistant au platine, et le sofétabart mipitécan plus bévacizumab à une chimiothérapie à base de platine associée au bévacizumab dans le cancer de l'ovaire sensible au platine.
NIRVANA	A randomized study of paclitaxel carboplatine followed by maintenance niraparib compared to paclitaxel carboplatine bevacizumab followed by niraparib+bevacizumab in patients with advanced ovarian cancer following a front line complete cytoreductive surgery (phase II).
PAROLA	Lymphadénectomie para-aortique dans les cancers du col de l'utérus localement avancés – phase 3.
PEMBROSSCHOT	Étude de phase 3 multicentrique, évaluant le pembrolizumab en combinaison à une CT à base de PAVEP en première intention chez des patientes atteintes d'un carcinome à petites cellules avancé de l'ovaire stades II-IV de type hypercalcémique.
RAINBO RED	Traitement adjuvant ciblé dans le cancer de l'endomètre basé sur les caractéristiques moléculaires, essais de la plateforme TransPORTEC – p53abn – RED, phase 3.
ROSCAN	An international multicentric randomized phase II evaluating dostarlimab in combination with niraparib versus niraparib alone compared to chemotherapy in the treatment of metastatic or recurrent endometrial or ovarian carcinosarcoma after at least one line of chemotherapy.
SALVOVAR	A pragmatic randomized phase III trial to assess the utility of adjusting chemotherapy dose & dosing schedule with the SALVage weekly dose-dense regimen in patients with poor prognostic OVARian cancers based on the tumor unfavorable primary chemosensitivity and incomplete debulking surgery (ARCAGY GINECO).
TMRG	Observatoire des tumeurs rares gynécologiques.