

Exposition à un produit anticancéreux




VERSION 2026




Que faire en cas d'exposition accidentelle à un produit de chimiothérapie ?

→ ÉTAPES PAR ÉTAPE :

① Alerter	② Isoler la zone contaminée	③ Se protéger et s'habiller avec :
<ul style="list-style-type: none"> - prévenir un collègue le plus proche - lui demander d'aller récupérer le kit d'exposition à un produit anticancéreux 	<ul style="list-style-type: none"> - faire sortir toute personne qui ne va pas participer à la décontamination de la zone contaminée - 2 professionnels doivent opérer pour la décontamination de la zone contaminée - délimiter la zone contaminée avec de la rubalise et/ou signalétiques 	<ul style="list-style-type: none"> - une casaque à tissu déperlant ML ou tablier imperméable - une charlotte, un masque FFP2, des lunettes de protection - des surchaussures imperméables - 2 paires de gants (nitrile + ménager au-dessus), en veillant à ce qu'ils recouvrent la blouse

④ CONDUITE À TENIR selon l'incident rencontré

TYPE D'INCIDENT	CONDUITE À TENIR
<p>FUITE DE PREPARATION</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ S'équiper de matériel absorbant (chiffonnettes non tissées ou pansements absorbants) et du flacon de poudre absorbante type Trivorex® et suivre les étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1- Verser la poudre absorbante autour du liquide, puis recouvrir le liquide avec la poudre 2- Laisser agir jusqu'à solidification du produit (≈ 5min) 3- Ramasser avec pelle et raclette et évacuer le tout (dont pelle et raclette) dans un contenant rigide dédié aux déchets des cytotoxiques ○ Essuyer (sans frotter ni brosser) la zone avec une chiffonnette imbibée de détergent désinfectant. Renouveler l'opération avec une nouvelle chiffonnette autant de fois que nécessaire ○ Changer de gants (jeter les gants ménagers et remettre une paire de gants en nitriles) et rincer abondamment la zone à l'eau ○ Ne pas utiliser d'eau de javel ○ Attendre 15min à partir du moment où le produit a été évacué avant de pénétrer dans la zone décontaminée ○ Tout le matériel ayant servi au nettoyage doit être jeté dans un sac DASRI ○ Si du linge ou vêtement sont souillés par des cytotoxiques, ils doivent être évacués dans un contenant dédié aux déchets des cytotoxiques également ○ Retirer la rubalise et/ou signalétique une fois que l'intervention est terminée ○ Informer le prescripteur de l'incident et évaluer avec lui et l'onco-pédiatre du CHU la nécessité d'une nouvelle prise du traitement  

<p>PROJECTION CUTANÉE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rincer abondamment à l'eau courante pendant 15 minutes ○ Nettoyer au savon doux et rincer pendant 5 minutes ○ Se sécher délicatement avec du papier absorbant par tamponnement ○ Si présence d'une sensation de brûlure, appliquer une pommade apaisante type Coldcream ou Hemoclar® ○ Consulter le médecin du travail ○ Faire une déclaration d'accident du travail
<p>PROJECTION OCULAIRE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si port de lentilles de contact, les retirer immédiatement et les jeter ○ Laver immédiatement l'œil atteint avec une solution stérile de chlorure de sodium 0.9% ou eau stérile ou à défaut eau du robinet au moins 5 min ○ Consulter en urgence un médecin ophtalmologue ○ Consulter le médecin du travail ○ Faire une déclaration d'accident du travail
<p>PROJECTION VESTIMENTAIRE ou LINGE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ NE PAS CIRCULER AVEC LES VÊTEMENTS SOUILLÉS : se faire fournir une tenue propre de rechange ○ Mettre 2 paires de gants (une paire de nitriles et les ménagers par-dessus) ○ Ôter les vêtements souillés lentement, en les roulant de façon à ne pas étendre la contamination ○ Placer les vêtements (professionnels ou personnels) dans un sac DASRI ○ En cas de pénétration jusqu'à la peau, appliquer la procédure projection cutanée

⑤ **Déclarer** l'incident et éventuellement faire une déclaration d'accident du travail

⑥ **Renseigner** la fiche « Composition du kit d'urgence en cas d'exposition accidentelle à un anticancéreux » de façon à ce que le matériel soit remis à disposition (fiche présente dans le kit)