

RECOMMANDATIONS RÉGIONALES CONCERNANT LES SOINS DENTAIRES CHEZ UN PATIENT AYANT REÇU UNE RADIOTHÉRAPIE SUR LA RÉGION CERVICO-FACIALE



Fiche d'information à destination des professionnels de santé (dentistes, médecins, ect.) sur les préconisations concernant les soins dentaires en territoire irradié afin de prévenir les complications dentaires (caries post-radiques) et osseuses (ostéoradionécrose)

Votre patient a reçu
une **radiothérapie sur la
région cervico-faciale**

Pour cette raison, il est **nécessaire** :

- ✓ de faire un **suivi dentaire régulier** tous les 6 mois pendant 2 ans puis tous les ans
- ✓ de maintenir une **bonne hygiène bucco-dentaire** avec
 - brossage des dents 3 minutes 2 fois par jour
 - fluoro-prophylaxie quotidienne (gouttières avec gel fluoré 5 minutes par jour, à vie)
- ✓ de contrôler les **facteurs de risque** (intoxications tabagique et alcoolique)

EN CAS DE SOINS DENTAIRES :

Il est important de connaître la dose d'irradiation reçue par l'os supportant la dent devant bénéficier d'un soin.

Si la dose reçue est inférieure à 30 Gy → une prise en charge « classique » peut être réalisée

Si la dose reçue est supérieure à 30 Gy → des précautions particulières doivent être prises

Si soin non invasif, comme :

- **Restauration coronaire**
- **Soins endodontiques**
- **Parodontie non chirurgicale** (détartrage, curetage, surfaçage...)
 - Anesthésie pouvant être loco-régionale ou para-apicale, sans utilisation de vasoconstricteurs
 - Contre-indication à l'anesthésie intra-septale ou intra-ligamentaire
 - Antibioprophylaxie obligatoire pour les soins endodontiques uniquement

Si soin invasif, comme :

- **Extractions dentaires**
 - Anesthésie pouvant être loco-régionale ou para-apicale, **sans utilisation de vasoconstricteurs**
 - Contre-indication à l'anesthésie intra-septale ou intra-ligamentaire
 - Geste à réaliser sous **couverture d'une antibiothérapie** à débiter au moins une heure avant le geste et poursuivie minimum 15 jours et jusqu'à cicatrisation muqueuse.
Recommandation : amoxicilline/acide clavulanique ou dalacine à doses curativesDes **précautions** doivent être prises lors de la réalisation du geste :
 - Régularisation osseuse
 - Pansement alvéolaire (en cas de troubles de l'hémostasie)
 - Sutures « étanches »
- **Soins de parodontie chirurgicale** : contre-indiqués
- **Soins d'implantologie et d'orthodontie** : à discuter au cas par cas

Fiche validée par les équipes de chirurgie de la sphère cervico-faciale des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers
Les chirurgiens maxillo-faciaux et stomatologistes restent disponibles pour répondre aux questions en cas de doute
ou effectuer des prises en charge spécifiques