

# ISOLEMENT PROTECTEUR

RCA-RESILIAENCE 2011

## **BUT :**

Réduire le risque de transmission d'un agent infectieux, connu ou présumé à un malade immunodéprimé (germes de l'environnement, d'autres patients, personnels, visiteurs).

## **ORGANISATION GENERALE :**

- Concerne des patients en aplasie (polynucléaires neutrophiles PNN<500/mm<sup>3</sup>), avec aplasie comprise entre 7 et 15j.
- Chambre individuelle avec sanitaires individuels, porte fermée (l'isolement géographique au sein du service facilite l'observance des mesures techniques).
- Ménage biquotidien des surfaces.
- Limitation des visites à 2 personnes à la fois dans la chambre et limiter les entrées/sorties par 24h.
- Pas de fleur ni de plante.
- Eau embouteillée possible.

## **PRECAUTIONS STANDARDS :**

- Lavage des mains et utilisation des SHA (solutions hydro alcooliques) par friction. Objectif : prévenir la transmission croisée par manu-portage.
- Port du masque. Objectif : protéger le patient des particules émises.
- Tenue vestimentaire propre du jour et sur-blouse propre du jour. Objectif : assurer une barrière complémentaire en cas de contact avec des surfaces potentiellement contaminées.
- Port des gants à usage unique pour le nettoyage et la désinfection de l'environnement et pour l'élimination des déchets et souillures (excréta, vomissures, matériel et linge souillés). Réserver l'usage des gants stériles pour les soins sur KTSC ou PAC.
- Manipulation de la ligne de perfusion avec des compresses imbibées d'antiseptique.
- Stockage à l'entrée de la chambre de tout le matériel nécessaire (masques, gants, blouses, SHA, compresses, matériel pour l'élimination des déchets...).

## **PRECAUTIONS RELATIVES AUX SOINS :**

- Grouper les soins : s'occuper du patient en aphasie en priorité.
- Privilégier le matériel à usage unique.
- Privilégier le matériel sécurisé.
- Toujours éliminer le matériel souillé à usage unique au plus près de son utilisation, dans un collecteur spécifique (en respectant les limites de remplissage de ce collecteur).
- Pour le matériel réutilisable : personnaliser le matériel pour l'enfant en aphasie (thermomètre, brassard à tension, stéthoscope...). Manipuler avec précaution et nettoyer au plus près du soin avant de désinfecter ou stériliser.
- Informer les visiteurs des mesures d'isolement protecteur par signalisation sur la porte avec support et message adapté.
- Dans l'unité de soins : signalisation sur le dossier de soins et la planification des soins.
- Pour les déplacements hors unité : signalisation sur bons de demandes d'examen pour informer le personnel du plateau technique.

## **REMARQUES :**

- Les déplacements hors unité sont **limités, organisés** et **protégés** (éviction des sujets contagieux)
- Port du masque « canard » de protection respiratoire par le patient immunodéprimé lors de tout déplacement hors de sa chambre. Objectif : réduire l'inhalation.  
(Différent du masque de soin porté par le soignant dont l'objectif est de réduire l'émission).