



Médicament

par voie orale en pédiatrie

Isotrétinoïne

Fiche d'informations spécifiques

Formes pharmaceutiques disponibles



CONTRACNE[®], CURACNE[®], PROCUTA[®]
ISOTRETINOÏNE ACNETRAIT[®],
Capsule molle de 5, 10, 20 ou 40 mg



Disponible en pharmacie de ville

Indication

Neuroblastome à risque élevé ou récidivant

Conservation

Conservation à température ambiante. Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conditions de prescription



Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste en oncologie.

Modalités d'administration



En 2 prises égales par jour.
Les capsules doivent être administrées au cours des repas



Si votre enfant ne peut pas avaler les capsules : Faire fondre la capsule dans du lait chaud ou de l'eau chaude en agitant.

Recommandations générales

Les capsules contiennent de l'huile de soja.
En cas d'allergie au soja ou aux cacahuètes, ne pas prendre les capsules.

Pour les filles en âge de procréer, le traitement sera débuté après réalisation d'un test de grossesse. Ce médicament est à utiliser avec une contraception efficace afin d'éviter tout risque de malformations du fœtus. Elle doit être poursuivi jusqu'à 4 semaines minimum après l'arrêt du traitement.



Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.
Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.

Effets indésirables généraux

Ces médicaments peuvent provoquer des effets indésirables généraux. Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



EFFETS INDESIRABLES CUTANES :

- Augmentation de la sensibilité au soleil : photosensibilisation.
→ Utiliser une crème solaire indice de protection 50.
- Sécheresse de la peau et des muqueuses (buccale, nasale, oculaire).



AUTRES EFFETS INDESIRABLES :

- Augmentation des triglycérides dans le sang (éviter les aliments gras)
- Maux de tête fréquents (donner antalgique si besoin)
- Douleurs osseuses (donner antalgique si besoin)



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.