

# Chimiothérapie

## par voie orale en pédiatrie



Fiche d'informations générales

### Les chimiothérapies *per os*

Traitement utilisant des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps. La posologie de chaque chimiothérapie est personnelle et déterminée par le médecin.

Les formes orales dites *per os* permettent un meilleur confort de vie.



### Comment donner le médicament ?

Les anticancéreux peuvent être irritants pour la peau ou les muqueuses.

Un lavage rigoureux des mains est nécessaire avant et après manipulation de ces médicaments.



Possibilité de porter des gants à usage unique et un masque.

Port obligatoire pour les femmes enceintes si elles doivent manipuler ces médicaments.



### Précautions en cas de manipulation

En cas de difficulté à avaler, il est possible de couper (avec un partage-comprimé, que l'on peut se procurer en pharmacie) ou d'écraser certains comprimés ou d'ouvrir certaines gélules. Attention, vérifiez bien si cela est possible en consultant la fiche RESILIAENCE du médicament. Et dans ce cas, suivez les recommandations suivantes.

Préparez la chimiothérapie toujours au même endroit, afin d'éviter la dissémination de molécules anti-cancéreuses dans l'environnement familial.

Avant d'ouvrir une gélule ou d'écraser un comprimé, installez-vous dans un endroit calme, sans passage, facilement nettoyable. Fermez les fenêtres pour éviter tout courant d'air.



Lavez-vous les mains avant et après manipulation (+/- gants, masque).

La poudre contenue dans les gélules ou issue des comprimés écrasés peut être parfois dissoute dans une boisson (eau, sirop, jus de fruits...) Dans ce cas, utiliser un récipient en verre qui sera réservé à l'enfant traité, ainsi que les autres ustensiles utilisés et la vaisselle doit être faite séparément.



Ne pas couper ou pulvériser des comprimés d'avance et ne pas ouvrir des gélules à l'avance. Les principes actifs peuvent être instables à l'air, l'humidité ou la lumière.

Après préparation, nettoyez le plan de travail avec votre détergent habituel.





## Gestion des excréta et des vomissures



Les chimiothérapies peuvent être retrouvées dans l'urine, les selles, les vomissures, la salive ou la sueur des patients traités. Les mesures de protection suivantes s'appliquent pendant la durée du traitement et jusqu'à 24H après (sauf cas particulier).

Les précautions de manipulation citées précédemment (tel que le lavage des mains) permettent une protection contre la surexposition aux anticancéreux.



En cas de souillure ou de contamination des vêtements ou des draps, laver ce linge rapidement et séparément, en machine, à température élevée (60-90°C).

Après utilisation, le matériel de recueil des excréta (pot de l'enfant par exemple), est rincé abondamment à l'eau du robinet puis lavé avec un détergent habituel et à nouveau rincé. Eviter l'eau de Javel, qui peut entraîner la formation de composés toxiques.



Il est conseillé d'uriner en position assise afin d'éviter toute contamination accidentelle.

## Modalités de prise après un vomissement

Si un vomissement survient dans les 30 minutes après la prise, il est nécessaire de redonner à nouveau le médicament. Si celui-ci survient au-delà de 30 minutes, reprendre la dose habituellement prescrite à partir de la prochaine prise.

Si ces vomissements deviennent récurrents, contacter le médecin qui suit votre enfant.



## Vigilance parentale



**SURVEILLANCE STRICTE et RESPECT DE LA PRESCRIPTION favorisent l'EFFICACITE du traitement.**

**Se référer aux fiches correspondant à chaque chimiothérapie afin de connaître les particularités du médicament.**