

Chimiothérapie

par voie orale en pédiatrie



Fiche d'informations spécifiques

Cyclophosphamide

ENDOXAN®

Formes pharmaceutiques disponibles

En pharmacie hospitalière :
Préparation magistrale, gélule au dosage prescrit pour votre enfant disponible sur ordonnance hospitalière.



En pharmacie de ville : ENDOXAN®
Comprimé de 50 mg enrobé non sécable en boîte de 50 comprimés, disponible sur ordonnance.



Conservation

Conservation à température ambiante. Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Conditions de prescription

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville.



Modalités d'administration



1 prise le matin, à jeun, avec un grand verre d'eau et bien s'hydrater.



Si votre enfant n'arrive pas à avaler les comprimés :
NE PAS LES BROYER.
Parlez-en à votre médecin ou pharmacien.



Si l'enfant n'arrive pas à avaler les gélules : elles peuvent être ouvertes et le contenu dissout dans une compote ou dans de l'eau. Se reporter à la fiche RESILIAENCE d'informations générales concernant les précautions en cas de manipulation.

Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.
Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.



Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



APHTES

Eviter les aliments acides, épicés et irritants. Maintenir une bonne hygiène buccale (brosse à dent souple et dentifrice sans menthol). Utiliser un bain de bouche à base de bicarbonate de sodium. En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contacter le médecin.



SURVEILLANCE RENALE

Difficulté à uriner ou douleurs lors des mictions. Faire boire l'enfant régulièrement et davantage. Si présence de sang dans les urines, douleurs intense à la vessie ou impossibilité d'uriner : Contacter le médecin.



EFFET CUTANE

Des modifications de la pigmentation des mains, des ongles et de la plante des pieds sont possibles.

Gestion des excréta

Les mesures de protection précisées dans la fiche générale concernant la gestion des excréta s'appliquent pendant la durée du traitement et jusqu'à quatre jours après.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.