

CHIM CYTARABINE

08

Chimiothérapie réalisée en HDJ ou en hôpital de proximité



PREPARATION ET CONSERVATION A LA RECEPTION

• SOLVANT :

- Aracytine IV : G5% ou NaCl 0,9 %
- Aracytine SC : solvant spécifique pour la poudre

• CONSERVATION APRES DILUTION : température ambiante

• DUREE DE CONSERVATION : se référer à l'étiquetage de la préparation

• DUREE DE STABILITE : 72 heures et si la dose est à 75 mg/m², 96 heures

VOIE D'ADMINISTRATION : Voie intraveineuse et sous-cutanée

DOSE MAXIMALE PAR INJECTION

NE CONCERNE PAS LES HAUTES DOSES

SELON LES PROTOCOLES

INTERACTION MEDICAMENTEUSE MAJEURE

NE PAS MELANGER AVEC :

- 5 Fluorouracile, Etoposide
- Héparine sodique
- Insuline
- Hémisuccinate de méthylprednisolone (Solumédrol®)
- Antibiotiques (Céfalotine, Gentamycine, Pénicilline G, Oxacilline)
- Phénytoïne

CONTRE INDICATIONS

ENCEPHALOPATHIE TOXIQUE ET DEGENERATIVE majorée par l'association d'une irradiation crânienne ou un traitement par Méthotrexate

CHIM CYTARABINE

08

Chimiothérapie réalisée en HDJ ou en hôpital de proximité



EXAMENS NECESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- **PAS D'ELEMENT CLINIQUE**
- **EXAMENS COMPLEMENTAIRES :**
 - NFS, plaquettes
 - Iono sang, urée, créatinémie
 - Transaminases, bilirubine

SOINS DE SUPPORT

ANTI-EMETIQUES: potentiel émétisant faible (10 - 30% des cas)

MODALITES D'ADMINISTRATION

- **VOIE SC :**
 - utiliser la solution reconstituée avec le solvant (20 mg/ml)
 - changer de site d'injection (cuisses, abdomen) à chaque injection
- **VOIE IV :** se référer aux protocoles

PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

- **NAUSEES, VOMISSEMENT**
- **DOULEURS ABDOMINALES**
- **DESQUAMATION PALMO-PLANTAIRE, ERYTHEME PALMO-PLANTAIRE**

ELEMENTS ET DUREE DE SURVEILLANCE

- **CUTANEE :** tant que les lésions persistent, crème émolliente et dermocorticoïdes
- **DIGESTIVE**

EXTRAVASATION DU PRODUIT

Produit non irritant