

# CHIM DTIC = DACARBAZINE

DETICENE®

11

Chimiothérapie réalisée en HDJ ou en hôpital de proximité



## PREPARATION ET CONSERVATION A LA RECEPTION

- **SOLVANT** : dilution possible dans du G5% ou du NaCl 0,9%
- **CONSERVATION** : température entre + 2°C et + 8°C à l'abri de la lumière impérativement
- **DUREE DE STABILITE** : se référer à l'étiquetage

## VOIE D'ADMINISTRATION **INTRAVEINEUSE**

- IV en 3 heures mieux tolérée qu'une IV courte
- Durée selon les protocoles

**DOSE MAXIMALE PAR INJECTION : 375 MG/M<sup>2</sup>**

## CONTRE-INDICATIONS

- **AFFECTION RENALE SEVERE**
- **AFFECTION HEPATIQUE SEVERE**

## EXAMENS NECESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- **PAS D'ELEMENT CLINIQUE**
- **EXAMENS COMPLEMENTAIRES :**
  - NFS, plaquettes
  - Iono sang, urée, créatinémie (adaptation des doses à discuter en fonction de la clairance de la créatinine)
  - Transaminases, bilirubine selon le risque d'insuffisance hépatique

# CHIM DTIC = DACARBAZINE

DETICENE®

11

Chimiothérapie réalisée en HDJ ou en hôpital de proximité



## SOINS DE SUPPORTS

**ANTI-EMETIQUES :** Potentiel émétisant très fort (> 90%), association d'anti-émétiques indispensable

## MODALITES D'ADMINISTRATION

- **A ADMINISTRER SEUL :** incompatibilité décelée avec de nombreux médicaments
- **DUREE :** perfusion IVL de 3 heures
- **A L' ABRI DE LA LUMIERE :** la poche et la tubulure sont à protéger pendant l'administration (utilisation de perfuseur opaque)

## PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

- **VOMISSEMENTS** immédiats mais parfois retardés dans les 12 heures
- **PHOTOSENSIBILISATION : ALOPECIE RARE**
- **TOXICITE LOCALE :** veinite
- **SYNDROME PSEUDOGRIPPAL :** apparaît en 7 jours (traitement par antipyrétiques), le plus souvent au 1er cycle

## ELEMENTS ET DUREE DE SURVEILLANCE

- **PREVENIR L'EXPOSITION AU SOLEIL :** utilisation d'écran total dans les jours suivant le traitement
- **VOMISSEMENTS**

## EXTRAVASATION DU PRODUIT

**PRODUIT IRRITANT** → cf fiche spécifique