



Chimiothérapie

par voie orale en pédiatrie

Fiche d'informations spécifiques

Hydroxycarbamide

HYDREA[®] ou SIKLOS[®]

Formes pharmaceutiques disponibles

En pharmacie hospitalière :
Préparation magistrale, gélule au dosage prescrit pour votre enfant disponible sur ordonnance hospitalière.



En pharmacie de ville : HYDREA[®]
Gélule verte et rose de 500 mg en boîte de 20 gélules disponible sur ordonnance hospitalière et de ville.

En pharmacie de ville : SIKLOS[®]
Comprimé sécable de 100mg en flacon de 60.



Conservation

Conservation à température ambiante. Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.



Conditions de prescription

Ce médicament peut être prescrit par un médecin hospitalier ou de ville.

Modalités d'administration



En dehors ou au moment des repas, avec un grand verre d'eau, en 1, 2 ou 3 prises par jour.



Si l'enfant n'arrive pas à avaler les gélules : elles peuvent être ouvertes et le contenu dispersé dans un grand verre d'eau et ingéré immédiatement. Certains excipients non solubles peuvent persister en surface. Se reporter à la fiche RESILIAENCE d'informations générales concernant les précautions en cas de manipulation.

Si l'enfant n'arrive pas à avaler les comprimés : il est possible de les dissoudre immédiatement avant leur prise, dans une petite cuillère contenant un peu d'eau. On peut y ajouter du sirop ou mélanger le tout à de la nourriture.

Recommandations générales



Au début du traitement, il est important de maintenir une hydratation abondante de votre enfant en fonction de son âge entre les repas pour maintenir le bon fonctionnement des reins (eau alcaline type Saint-Yorre, jus de fruit, soupe ...).



Effets indésirables généraux

Les chimiothérapies peuvent provoquer des effets indésirables généraux qui sont souvent plus fréquents par voie intraveineuse que par voie orale.

Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Une perte de cheveux (réversible à l'arrêt du traitement) peut survenir. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



DIARRHÉE ET DOULEURS ABDOMINALES

Eviter les boissons très froides, les fruits et les légumes crus. Privilégier les féculents et bien hydrater l'enfant. Si les symptômes persistent > 48h, contacter le médecin.



EFFETS INDESIRABLES CUTANÉS

Augmentation de la sensibilité au soleil : photosensibilisation.
Utiliser une crème solaire indice de protection 50.



AUTRES EFFETS INDESIRABLES POSSIBLES

Réaction cutanée : éruptions, démangeaisons, hyperpigmentation...
Laver l'enfant avec un savon doux et bien hydrater sa peau

Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.