



Médicament

par voie orale en pédiatrie

Imatinib

GLIVEC® ou génériques

Fiche d'informations spécifiques



Conditions de prescription

Ce médicament doit être prescrit par un médecin hospitalier.

Conservation

Conservation à température ambiante. Dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Formes pharmaceutiques disponibles



Disponible en pharmacie de ville : GLIVEC® ou génériques, comprimé pelliculé
Dosé à 100 mg, boîte de 60, sécable
Dosé à 400 mg, boîte de 30, non sécable

Modalités d'administration



Administration au cours des repas avec un grand verre d'eau :
En 1 prise par jour pour des posologies allant jusqu'à 600 mg
En 2 prises par jour matin et soir pour les doses supérieures



Ne jamais couper les comprimés non sécables, écraser, mâcher ni sucer tous les comprimés.



En cas de difficultés à avaler, les comprimés peuvent être dispersés dans un volume suffisant d'eau ou de jus de pomme :
50mL pour un comprimé à 100 mg et 200mL pour un comprimé à 400 mg
Agiter et administrer immédiatement après dispersion complète

Interactions diverses



Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules. Ne donner aucun nouveau médicament à l'enfant sans l'accord du médecin ou du pharmacien.
La consommation de jus de pamplemousse et de millepertuis doit être évitée.



Effets indésirables généraux

Ces médicaments peuvent provoquer des effets indésirables généraux. Si des nausées et des vomissements persistent, prévenir le médecin. Les plaquettes et les globules blancs peuvent diminuer. Soyez attentif à l'état général de l'enfant afin de détecter une éventuelle fièvre.

Effets indésirables spécifiques observés chez l'enfant



CRAMPES OU DOULEURS MUSCULAIRES ET OSSEUSES

Faire boire régulièrement l'enfant.



MAUX DE TÊTE

Contacter le médecin en cas de rougeurs, gonflements ou démangeaisons au niveau des yeux.



DIARRHÉE ET DOULEURS ABDOMINALES

Éviter les boissons très froides, les fruits et les légumes crus. Privilégier les féculents et bien hydrater l'enfant. Si les symptômes persistent > 48h, contacter le médecin.



EFFETS INDESIRABLES CUTANÉS

Augmentation de la sensibilité au soleil : photosensibilisation. Utiliser une crème solaire indice de protection 50.

Gestion des excréta

Les mesures de protection précisées dans la fiche générale concernant la gestion des excréta s'appliquent pendant la durée du traitement et jusqu'à une semaine après.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des enfants. Prendre conseil auprès de l'équipe médicale pour toute information supplémentaire.